

THÈSES


présentées

**A LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS**

pour obtenir le titre de
DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ


par

Vinod LAL



1^{re} THÈSE : "Etude des thrombo-anticorps Immuns d'origine transfusionnelle".

2^e THÈSE : Propositions données par la Faculté.



Soutenues le 28 mai 1959 devant la Commission d'Examen.

M. WURMSER

Président

M^{lle} LE BRETON

M. LENDER

} Examinateurs



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41556003_0005

THÈSES


présentées

**A LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS**

pour obtenir le titre de
DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ


par

Vinod LAL



1^{re} THÈSE : "Etude des thrombo-anticorps Immuns d'origine transfusionnelle".

2^e THÈSE : Propositions données par la Faculté.



Soutenues le 28 mai 1959 devant la Commission d'Examen.

M. WURMSER

Président

M^{lle} LE BRETON

M. LENDER

} Examineurs

THÈSES

A LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

DOCTEUR EN MÉDECINE

PAR M. LAL

THÈSE : Étude de l'hyperostose fronto-pariétale (hyperostose frontopariétale)
2. THÈSE : Hyperostose frontopariétale (hyperostose frontopariétale)



Présentée le 22 mai 1922 devant le Comité de Faculté

Président : M. LAL

M. DE BERTIN

M. LAL

- FACULTE DES SCIENCES DE L'UNIVERSITE DE P A R I S -

P R O F E S S E U R S

Doyen J. PERES

G. JULIA	T	Analyse supérieure & Algèbre supérieure	SOLEILLET	T	Physique
FOCH	T	Mécan. physique et ex- périmentale	FORTIER	T	Mécanique expérim. des fluides
de BROGLIE	T	Théories physiques	DANJON	T	Astronomie
PRENANT	T	Anatomie et Histol. comparées	LAPORTE	T	Physique générale et Radioactivité
PERES	T	Mécanique des fluides & applications	JANET	T	Mécanique analytique et Mécaniq. céleste
M. CURIE	T	Physique (S.P.C.N.)	PETIT	T	Biologie maritime
BARRABE	T	Géol. struct. et Géol. appliquée	QUENEY	T	Météorologie et dynamique atmosphérique
J. BOURCART	T	Géogr. physique et Géogr. dynamique	GALLIEN	T	Embryologie
PLANTEFOL	T	Botanique	EICHHORN	T	Biologie végétale (S.P.C.N.)
GRASSE	T	Evolution des êtres organisés	de CUGNAC	T	Biologie végétale (S.P.C.N.)
PREVOST	T	Chimie organique	Mle CAUCHOIS	T	Chimie Physique
BOULIGAND	T	Application de l'analyse à la Géométrie	THELLIER	T	Physique du globe
CHAUDRON	T	Chimie appliquée	L'HERITIER	T	Génétique
WYART	T	Minéralogie	GRIVET	T	Radioélectricité
TEISSIER	T	Zoologie	PONCIN	T	Mécanique générale
MANGENOT	T	Biologie végétale	DUBREIL	T	Arithmétique et théorie des nombres
P. AUGER	T	Physique quantique et relativité	QUELET	T	Chimie organique
MONNIER	T	Physiol. générale	CAGNIARD	T	Géophysique appliquée
PIVETEAU	T	Paléontologie	CHAMPETIER	T	Chimie macromoléculaire
ROCARD	T	Physique (ENS)	CUVILLIER	T	Géologie structurale et Géologie appliquée
H. CARTAN	T	Mathématiques (ENS)	JUNG	T	Pétrographie
LAFFITTE	T	Chimie générale	TRILLAT	T	Microscopie et diffraction électronique
FAVARD	T	Géométrie supérieure	WIEMANN	T	Chimie organique et structurale
COULOMB	T	Physique du Globe	JACQUINOT	T	Spectroscopie et physique céleste
Mle COUSIN	T	Biologie animale (SPCN)	VASSY	T	Physique de l'atmosphère
CHRETIEN	T	Chimie minérale	DESTOUCHES	T	Théories physiques
P. DRACH	T	Zoologie	M. PRUVOST	T	Géologie
KASTLER	T	Physique (E.N.S.)	AMIEL	T	Chimie Générale (P.C.B.)
EPHRUSSI	T	Génétique	HOCART	T	Minéralogie
WURMSER	T	Biologie physico-chimiq.	J.P. MATHIEU	T	Physique (P.C.B.)
RIVIERE	T	Géologie (S.P.C.N.)	BOUTEAUX	T	Biologie animale (P.C.B.)
GAUTHERET	T	Biol. végétale (PCB)			
LUCAS	T	Recherches physiques			
A. THOMAS	T	Biologie cellulaire	MAY	T	Biologie animale (P.C.B.)
ARNULF	T	Optique appliquée			
M. MORAND	T	Enseignement de Physique			

.....

CHOQUET	T Calcul différentiel et Intégral	Mme DUBREIL	T Mathématiques
FELDMANN	T Biologie (P.C.B.)	Mme LELONG	T Mathématiques (E.N.S.)
GUINIER	T Physique des solides	BELLAIR	T Géologie (S.P.C.N.)
JOST	T Physiol. comparée	COTTE	T Physique (M.P.C.)
FORTET	T Calcul des probabilités	LAMOTTE	Zoologie (E.N.S.)
SCHWARTZ	T Calcul différentiel et Intégral	LE ROLLAND	Mécan. des fluides
CHOUARD	T Physiol. végétale	MICHEL ANDRE	T Chimie (S.P.C.N.)
MALAVARD	T Aviation	OLMER	T Energétique générale
BRELOT	T Calcul différentiel	ROUAULT	T Physique générale
NORMANT	T Chimie organique	GAUTHIER	T Mécan. appliquée
BENARD	T Chimie minérale	BARCHEWITZ	Chimie Physique
BUVAT	T Botanique (E.N.S.)	BROSSEL	Physique atomique
DUGUE	T Statistiques mathém.	BUSER	Biologie animale
GELOSO	T Chimie (S.P.C.N.)		- P.C.B. -
SOULAIRAC	T Psychophysiologie	CAMUS	Biologie végétale (P.C.B.)
ULRICH	T Physiologie végétale	CASTAING	Physique générale
MARECHAL	T Optique théorique et appliquée	CURIEN	Minéralogie et cristallographie
KIRRMANN	T Théories chimiques	MOYSE	Physiologie végétales
CHADEFAUD	T Botanique	NOIROT	Evolution des êtres organisés
DESTRIAU	T Physique (M.P.C.)	PANNETIER	Chimie (S.P.C.N.)
Mle LE BRETON	T Physiol. générale	POSSOMPES	Biologie animale (P.C.B.)
SALEM	T Mathématiques générales	PULLMANN	Chimie théorique
LELONG	T Mathématiques générales	TEILLAC	Physique nucléaire et Radioactivité
DEVILLERS	Anatomie et Histologie comparées	TONNELAT	Biol. physico-chimique
EHRESHMANN	T Topologie algébrique	VILLE	Econométrie
FRANÇON	T Physique (S.P.C.N.)	WILLEMART	Chimie (P.C.B.)
GLANGEAUD	T Géogr. physique et Géol. dynamique	DODE	T Chimie
GODEMENT	T Mathématiques (M.P.C.)	FREYMAN	T Physique (S.P.C.N.)
PISOT	T Calcul des Probabilités	GUINOCHE	T Biol. Vég. (ORSAY)
ROCH E.	T Géologie	ROLLET	T Chimie (P.C.B.)
SCHATZMANN	Astrophysique	Mle JOSIEN	T Chimie (P.C.B.)
TERMIER	T Paléontologie strati- graphique	CHEVALLEY	T Géométrie algébrique et théorie des groupes
ZAMANSKY	T Mathématiques Génér.	ARNOULT	T Physique (Orsay)
LENNUIER	Physique (M.G.P.)	CHAPELLE	T Physique (P.C.B.)
RIZET	Génétique	DELANGE	T Mathématiques (Orsay)
ROUTHIER	Géologie appliquée	DENY	T Mathématiques (Orsay)
Mme TONNELAT	T Théories physiques	GERMAIN P.	T Méc. théor. des fluides
DIXMIER	T Mathématiques (M.P.C.)	LUCAS G.	T Géologie
SOUCHAY	T Chimie générale		
AIGRAIN	T Electrotechnique		
BRUSSET	Chimie minérale		
M. LEVY	Physique théorique		
Mme CHAIX	Chimie biologique		
Mme HUREL-PY	Biol. végétale (P.C.B.)		
PLAUX	Chimie (P.C.B.)		
BRUN	Méc. expér. des fluides		
LEDERER	T Chimie des substances organiq. naturelles		

SECRETAIRE GENERAL C. MONT

A Monsieur le Professeur

René WURMSER

Professeur à la Faculté des Sciences de Paris

Qui nous a fait le grand honneur
de présider cette Thèse et dont
les conseils nous ont été si
précieux.

En témoignage de notre bien
sincère reconnaissance et notre
respectueux dévouement.

A Mademoiselle E.LE BRETON,
Professeur à la Faculté des Sciences de Paris.

Qu'elle Veuille bien trouver dans ce travail
le témoignage de notre grande admiration et
de notre profonde gratitude.

A Monsieur
Professeur T. LENDER,
Maître des Conférences au Collège de France,

En témoignage de notre sincère reconnaissance
et de notre profond respect.

A Monsieur le PROFESSEUR Agrégé
Jeann DAUSSET
CHEF de Laboratoire au
Centre National de Transfusion Sanguine
Paris.

Qui nous a inspiré le sujet
de cette Thèse.

En le remerciant de son
enseignement,
de ses précieux conseils et
de toute sa bienveillance à
notre égard.

En témoignage de notre profonde
reconnaissance et notre
respectueux dévouement et
remerciement.

A Monsieur le Docteur

Jacques COLOMBANI

En témoignage de notre profonde reconnaissance
pour les précieux conseils qu'il nous a
prodigués quotidiennement au cours de notre
travail.

C'est grâce à:

- Mademoiselle Monique COLIN
- Mademoiselle Helene Brecy
- Madame Jeanne Evelin

qui'ont bien voulu nous aider pratiquement
dans nos expériences et qui
trouveront notre très profonde gratitude
et remerciement pour ce travail.

Au

Docteur J.P. SOULIER

Docteur M. BESSIS

Docteur S. LEWI

Docteur J. MOULLEC

Docteur M. BURSTEIN

Docteur J. LEWIN

A

Monsieur le Professeur G.MARCHAL

Le Professeur G. BILSKI-PASQUIER

Le Docteur S.PERLES

Le Docteur M. SAMAMA

Le Docteur M. LEROUX

Le Docteur DUHANEL

En témoignage de nos senti-
ments reconnaissants

à Mlle C. BRIERE

Mlle J. THIRIAT

Mme C. PANIS

Mlle GUYARD

Mme J. AROIX

Mlle M. MICHOU

Monsieur TALLON

Madame VIAUD

Docteur ZIMMET

Monsieur CAZENAVE

Monsieur PADOUX

Monsieur RAGHAVAN

En témoignage de notre
reconnaissance

A Mes Maitres anciens

Messieurs

Les Prof.

-- A.VANNOTTI	, Université de Laussane	
-- G.HEIMLER	, do	do
-- P.DECKER	, do	do
-- J.L.NICOD	, do	do
-- M.P.HAUDROY	, do	do
-- R.ROCHAT	, do	do
-- C.VERDUN	, do	do
-- J.C.BHARUCHA	AGRA MEDICAL COLLEGE(Indes)	
-- C.B.SINGH	do	do
-- S.N.CHATTERJEE	do	do
-- G.N.VYAS	do	do
-- P.N.WAHI	do	do

Nous leur gardons une profonde reconnaissance
et une respectueuse affection pour l'ensei-
-gnement qu'ils nous ont donné.

A la memoire de

MONSIEUR LE DOCTEUR KARL LANDSTEINER

A son Excellence ,

Monsieur le President d'Inde,

Hon'ble DR. RAJENDRA PRASAD.

A son Excellence ,

CONTESS OF MOUNTBATTEN OF BURMA.

pour ses affection avec les expressions de mes
sincères gratitudes et de ma respectueuse
affection.

A son Excellence ,

Dr.PATTABHI SITTARAMIYYA,
Ex-Governor of Madhya Pradesh.

A Messieurs

Les Docteurs

-- A.S.WEINER	-- P.MOLLISON.
-- R.R.A.COOMBS	-- R.R.RACE.
-- W.DANESHEK	-- R.G.MACFARLANE,
-- J.V.DACIE	-- OTTO HARTMANN.
-- J.LUNDEVALL	-- I.DUNNSFORD
-- P.SPEISER	-- G.GYER.

qui m'ont fait profiter de ses grandes
experiences et m'ont prodigués ses précieux
conseils,
qu'ils trouveront ici l'expression de ma vive
reconnaissance.

A Mes AMIS,

Monsieur le Docteur A.EYQUEM,
Monsieur le Docteur SAINT -PAUL,
Monsieur le Docteur P.HILLOT,
Monsieur le Docteur J.FINE,
Monsieur le Docteur E.CLAXTON et Mme;CLAXTON,
Monsieur le Docteur PAT PETERI,
Monsieur le Docteur G.SAMBOO,
Monsieur le COL. B.K.SHEOREY,
Monsieur M.L.OBEROI,
Monsieur le Docteur HAMILTON-TURNER,
Madame le Docteur Y.BERGEROT-BLONDEL,
Madame le Docteur PODLIACHOUK,
Monsieur le Professeur J.ROCHAT et Madame ROCHAT
Monsieur le Professeur, E.ROSSIARD,
Madame TUPINIER,
Mademoiselle, M.J. RINDERKNECHT,
qui trouveront vraiment mes
respectueuses affections et
gratitudes très sincères.

A na Femme

SUSHI

et

A mes enfants

Manju

Raja

Ruby

Shishu

Baby MADHU

Faible témoignage de mon
affection la plus sincère.

ETUDE DES THROMBO-ANTICORPS IMMUNS D'ORIGINE TRANSFUSIONNELLE.

TABLE DES MATIERS.

- I. INTRODUCTION.
- II. HISTORIQUE
 ETAT ACTUEL DE L'IMMUNOHÉMATOLOGIE DES PLAQUETTES.
- III. LES DIVERS ANTIGÈNES PLAQUETTAIRES.
- IV. LES ANTICORPS ANTI-PLAQUETTAIRES.
- V. LES ISO-THROMBO-AGGLUTININES IMMUNES.
 (Travail personnel)
- VI. TECHNIQUE.
- VII. DISCUSSION.
- VIII. CONCLUSION.
- IX. LES FIGURES.
- X. LES TABLEAUX.
- XI. BIBLIOGRAPHIE.

.....

I N T R O D U C T I O N



INTRODUCTION

L'immunohématologie est devenue au cours de ces dernières années un champ d'étude très long et très important. On sait maintenant que le conflit anticorps-antigène est responsable de la production d'anémie hémolytique acquise. Le même mécanisme est sans doute responsable du développement de certains types des leucopénies et des thrombopénies.

A la suite de la découverte et de l'étude des anticorps anti-leucocytaires, EVANS et al¹, MIESCHER et al², STEFANINI et al³, et DAUSSET et al⁴ ont apporté la preuve d'un pouvoir antigénique des plaquettes humaines conduisant à la production des anticorps anti-thrombocytaires à la suite d'une immunisation transfusionnelle ou d'une incompatibilité maternelle.

Au cours de ces dernières années, beaucoup de travaux concernant les thrombo-anticorps sont apparus. Mais, des techniques plus sûres pour la détection des divers anticorps sont encore désirables avant de pouvoir donner aux cliniciens les indications diagnostiques et thérapeutiques qu'ils attendent.

Les conditions requises pour l'apparition des thrombo-anticorps immuns sont les mêmes qui sont à l'origine de la formation des anti-érythrocytaires, c'est donc chez les polytransfusés et chez les multipares qu'on devait les trouver.

C'est à l'étude des thrombo-agglutinines immunes, surtout d'origine transfusionnelle, que nous nous sommes consacrés. Nous avons divisé notre travail de la façon suivante :

1 - L'opposition entre la thrombo-aggrégation (I : stade de la métamorphose visqueuse) et la thrombo-agglutination (phénomène immunologique).

2 - Mise au point de la technique (Traitement du sérum pour le débarrasser des facteurs de la coagulation par l'inactivation à 56° C et par traitement par le sulfate de baryum. Traitement de la suspension plaquettaire, pour débarrasser l'atmosphère plaquettaire des facteurs de la coagulation. Chauffage de la suspension des plaquettes lavées quelques secondes à 56° C. Influence de l'agitation sur la réaction).

3 - Etudes des caractères des anticorps thrombo-agglutinants.

- Thermostabilité,
- Optimum thermique,
- Optimum de pH,
- Optimum d'ionisation,
- Influence du milieu,
- Fractionnement du sérum,
- Etude de la prozone,
- Etude du système inhibiteur thermolabile de la thrombo-agglutination (C').

4 - Autres méthodes de détection de ces anticorps :

- la lyse et l'opsonisation,
- la précipitation,
- la fixation du C',
- la thrombo-élastographie.

5 - L'étude de la spécificité par les absorptions spécifiques et par les éluations correspondantes. Etude des éventuels groupes plaquettaires.

6 - Corrélation avec les autres anticorps antiplaquettaires,

- avec les anticorps incomplets antiplaquettaires décelés par la consommation de l'antiglobuline.
- avec les thrombo-agglutinines décelées à froid.

7 - Corrélation avec d'autres anticorps :

- anti-globules rouges : pas de corrélation,
- anti-globules blancs : co-existence très fréquente.

CHAPITRE II.

HISTORIQUE

ETAT ACTUEL DE L'IMMUNO-HEMATOLOGIE DES PLAQUETTES.

L'ANTIGENICITE DES PLAQUETTES.

MARINO (5) en 1905 et LESOURD et PAGNIEZ (6) en 1906 ont démontré la possibilité d'obtenir des sérums anti-plaquet-taires chez des animaux après l'injection des plaquettes hétérologues.

Après CHEVREL et ROGER (7) démontrent que sous l'influence d'un tel sérum, des changements morphologiques surviennent qui produisent une lyse des plaquettes.

COLE (8) utilise pour la première fois un sérum antiplaquettaire humaine préparé chez le lapin. Il a fait des expériences sur les plaquettes humaines et a observé une agglutination puis la lyse. Il n'y a aucune relation sur les plaquettes des animaux de la même espèce.

LEDINGHAM (9) et LEDINGHAM et BEDSON (10) observent un purpura thrombo-cytopénique chez les animaux qui ont reçus des injections de sérum antiplaquettaire.

TOCANTINS (11) dans ses études plus approfondies a observé après les injections intrapéritonéales d'un sérum anti-plaquettaire chez les chiens un abaissement du nombre des plaquettes et l'apparition de taches pétéchiâles et d'hémorragies gastro-intestinales. Mais après quelques jours le taux des plaquettes redevenait normal.

ACHARD et AYNAUD (12) au cours du choc anaphylactique par injection de sérum hétérologue ont observé la même thrombo-pénie. Ils ont proposé la même explication pathogénique.

Quelques auteurs ont observé la présence des anti-gènes plaquettaires communs entre l'espèce humaine et certaines espèces animales. Il y a en effet une certaine communauté antigénique entre les plaquettes humaines et celles d'animaux.

En 1954, STEFANINI et ADELSON (13) ont noté dans 11 cas la présence d'une agglutinine hétérophile active sur les hématies de mouton et sur les plaquettes d'animaux mammifères (de lapin, de rats, et de chiens etc.).

(7).

FILLO (14) a remarqué q'un sérum de lapin anti-plaquettaire de cobaye était capable d'agglutiner les plaquettes de cobaye ainsi que celles de l'homme.

En 1953 ,MIESCHER et coll. (15) en proposant un test pour détecter les anticorps anti-plaquettaires, observent que le sérum de certaines malades atteints de purpura thrombopénique idiopathique a une action thrombopénisante accentuée chez le lapin .

Tandis que, JAMRA et Coll. (16) ont trouvé une thrombopénie après injection de sérum contenant une thrombolyse active in vitro sur les plaquettes humaines.

STEFANINI et Coll. (17) ont pu observer les agglutinines anti-plaquettaires décelées au cours d'un purpura thrombopénique par contact avec des plaquettes de singe.

SAINT PAUL et MILOT (18) et MILOT et VERMA (19) montrent une communauté antigénique entre les plaquettes humaines et celles du mouton, de chèvres , du cheval et du porc. Ces expériences ont été faites au cours de travaux sur l'anaphylaxie passive locale.

Dans une étape ultérieure, l'auto-antigénicité des plaquettes humaines a été suggérée.

C'est EVANS et ses collaborateurs^{2,3} qui ont remarqué qu'une thrombopénie peut apparaître au cours de certaines anémies hémolytiques avec auto-anticorps. La fréquence des tests de COOMBS positifs au cours de ces observations et même en dehors de celles-ci au cours des thrombopénies chroniques, a évoqué à ces auteurs qu'un processus d'auto-immunisation pouvait intervenir dans la genèse de nombreux purpuras thrombopéniques idiopathiques. A l'appui de cette hypothèse, ils ont pu mettre en évidence dans le sérum de certains malades atteints de purpura thrombopénique idiopathique, une substance assimilée à un auto-anticorps, presque capable d'agglutiner leurs propres plaquettes. Dans ces cas où le purpura thrombopénique "auto-immun" accompagnerait une anémie hémolytique, les auteurs pensent cependant que la spécificité des auto-anticorps antiplaquettaires est distincte de celle des auto-anticorps anti-érythrocytaires.

HARRINGTON, MINNICH, HOLLINGWORTH et MOORE^{4,5} montrent qu'une transfusion de 250 cc. de plasma ou de 500 cc du sang total de malades atteints de purpura thrombopénique idiopathique à des sujets non thrombopéniques permet de reproduire le tableau biologique de la maladie. Ils observent une baisse rapide et quelquefois importante du nombre des plaquettes circulantes chez les receveurs ; cette thrombopénie apparaît dans la plupart des cas en 30 à 60 minutes, devient maxima en 2, 3 heures, et persiste de 4 à 7 jours ; elle s'accompagne d'un allongement du temps de saignement, de signes de fragilité capillaire, d'une diminution de la consommation de la prothrombine, et, dans certains cas, d'une déficience de la rétraction

du caillot. Chez deux des receveurs, un purpura hémorragique est apparu dans les cinq premières heures, les signes cliniques ont suivi une évolution parallèle à la thrombopénie, la guérison est survenue en 4,7 jours.

Les travaux de STEFANINI et CHATTERJEE²⁵ et de HIRSCH et GARDNER⁽²⁴⁾ montrent que la survie des plaquettes transfusées à des malades atteints de purpura thrombopénique idiopathique est très inférieure à la normale. La durée de survie n'est pas influencée par splénectomie, ce qui paraît éliminer, dans ces cas, une séquestration splénique des plaquettes.

En même temps, DAUSSET, DELAFONTAINE et FLEURIOT²⁶, STEFANINI, DAMEHESK²⁷ et Coll. ont apporté des arguments en faveur de l'existence au cours de certains purpuras thrombopéniques idiopathiques de substances sériques ayant une activité antiplaquettaire, décelable par les tests in vitro.

STEFANINI et Coll.²⁷, et DAUSSET, MALINVAUD, HARRINGTON et Coll.⁽²⁸⁾ ont trouvé des thromboagglutinines chez des malades ayant reçu des transfusions et, dans ces cas, il faut donc envisager l'hypothèse d'une sensibilisation contre certains antigènes dont la présence sur les plaquettes détermine pour ces éléments comme pour les autres cellules du sang une spécificité de groupe.



III ème CHAPITRE.

LES DIVERS ANTIGENES PLAQUETTAIRES.

Il y a deux types d'antigènes présents sur les plaquettes :

I - Les antigènes communs avec les antigènes érythrocytaires,

qui ne peuvent être responsables qu'accessoirement de l'immunisation chez les polytransfusés.

II - Les antigènes proprement plaquettaires.

Ces antigènes sont responsables de la production chez les polytransfusés des anticorps antiplaquettaires.

Sous le premier groupe d'antigènes, nous devons compter :

1. Les antigènes du système ABO
2. Les antigènes du système Rhésus
3. Les antigènes d'autres systèmes érythrocytaires.

I. Les Antigènes du système ABO

Dans un travail de 1939, SCHAFER et GEMNERICH ont démontré une faible inhibition de l'agglutination des hématies A et B soumises à l'influence de plasma anti-A et anti-B lorsqu'ils ont ajouté à la réaction un plasma riche en plaquettes du même groupe que les hématies testées.

En 1954, MOREAU et ANDRE ont montré que les plaquettes provenant d'individus de groupes A et B absorbaient spécifiquement les agglutinines des sérums anti-A et anti-B. Ils ont obtenu des baisses de titre au cours de ces absorptions.

En Israël, les antigènes de groupe ABO sur les plaquettes sanguines ont été particulièrement étudiés : GUREVITCH et NELKEN ont provoqué l'agglutination des plaquettes provenant d'individus de groupe A

ou B par les sérums anti-A et Anti-B. De plus auteurs montrent que les anti-corps anti-A et anti-B peuvent être absorbés sur les plaquettes correspondantes. Les plaquettes A₂ s'agglutinent peu ou pas du tout en présence de sérum anti-A.

GUREVITCH ,NELKEN (36) EYQUEM ,PODLIACHOUK,MAUPIN (38) ,HERVIER (39) et SCHAFFER ,GENNERICH (40) ont mis en lumière que les plaquettes provenant de sujets A₁ sont susceptibles d'absorber les sérums anti-A façon plus rapide et intense que les plaquettes de sujets A₂ . Les ^{travaux} mêmes étaient pratiqués par BROUSSY,DUCOS,et RUFFIE (41): le fait que les plaquettes A₁ absorbent spécifiquement les sérums anti-A et sont sans action sur le sérum anti-H prouve que l'antigène A₁ existe dans les plaquettes de sujets de groupe A₂ ; de même l'action d'un sérum anti-H sur des plaquettes de sujets de groupe A₂ ou O renferment l'antigène H.

RUGGIERI et BOLOGNESI (42) trouvent ainsi la présence des antigènes du système ABO.

DAUSSET et MALINVAUD (43) ont utilisé une méthode d'agitation et ont confirmé la présence des antigènes A et B sur les plaquettes normales et pathologiques.

COOMBS ,BEDFORD,et ASHHURST (44) ont retrouvé les antigènes A et B sur les plaquettes par leur méthode d'agglutination mixte.

2) LES ANTIGENES DU SYSTEME RHESUS.

Sur le plan théorique il paraît logique que les plaquettes soient porteurs des mêmes antigènes que les erythrocytes puisque les trois lignées cellulaires du sang dérivent d'une même cellule souche.

Mais, selon divers travaux de la littérature il apparaît que les équipes de chercheurs se divisent en deux groupes:-

1. Les uns ont trouvé ; l'antigène D sur les plaquettes.
2. Les autres ne l'ont pas trouvé.

1. Dans la première classe on range:

DARRIGOL (45) , RUGGIERI et BOLOGNESI (46) ont montré la présence des antigènes D sur les plaquettes.

Recemment en 1958, DAUSSET , COLOMBANI et EVELIN (47) ont montré la présence de l'antigène Rh (D) dans les plaquettes et aussi dans les leucocytes humains par une méthode de consommation de l'anti-D et surtout de consommation de l'antiglobuline.

MOULINIER , SERVANTIE (48) ont détecté par le test de consommation d'antiglobuline l'antigène D sur les plaquettes des individus Rh+ (D) .

DUCOS, BROUSSY, et RUFFIE (49) ont mis en évidence des antigènes D, C, c, C^w, et E sur les plaquettes humaines.

2) Tandis que MEYER, WUILLERET et HASSIG (50) utilisant les méthodes d'agglutination et d'absorption sont arrivés à des résultats négatifs.

GUREVITCH, NELKEN (51) a l'aide de huit techniques différentes ^{es} ne sont pas parvenus à des résultats concluants. Par absorption , sur 21 expériences , trois fois une faible réduction du titre de l'anti-D a été obtenue. Par le test indirect à l'antiglobuline sur 70 expériences ,

3 résultats positifs ont été notés. Douze fois l'absorption d'un anti-D marqué par des isotopes radioactifs a montré une absorption sur les plaquettes provenant d'individu Rh+ plus forte que sur les plaquettes provenant d'individus Rh- . Toutes les autres épreuves (agglutination directe, élution agglutination mixte érythrocyte-plaquettes, test direct à l'anti-globuline, consommation de l'antiglobuline) sont restées négatives.

ASHHURST, BEDFORD et COOMBS (32) utilisant la technique d'agglutination mixte érythrocytes-plaquettes et le test / mixte à l'antiglobuline n'ont obtenu que des résultats négatifs.

3) LES AUTRES ANTIGENES DE GROUPE ERYTHROCYTAIRE.

Nous constatons l'existence des antigènes des érythrocytes sur les plaquettes, d'après des travaux des auteurs suivants.

ASHHURST, BEDFORD et COOMBS (53) admettent l'existence sur les plaquettes des antigènes appartenant au système M et N et ont également démontré la présence des antigènes Lu^b et Lewis sur les plaquettes et aussi l'antigène Tj^a .

BROUSSY, DUCOS et RUFFIE (54) supportent la présence de M et N système sur les plaquettes.

Par leur technique d'absorption, ils ont montré la présence d'antigène P sur les plaquettes (55).

Les mêmes auteurs avec la collaboration de Mlle. MARTY (56) ont exposé les résultats de leur expériences avec les sérums anti-Kell et anti Fy^a qui sont absorbés uniquement par les plaquettes sanguines de sujets possédant ces antigènes.

LES ANTIGENES PROPREMENT PLAQUETTAIRES.

HIRSCH et GARDNER (57) et STEFANINI et Coll. (58) en 1952 prouvent l'existence d'antigènes proprement plaquettaires pendant les transfusions thérapeutiques. Ils ont observé la chute de nombre de plaquettes après quelques transfusions chez les malades atteints de thrombopénie secondaire.

Ces résultats suggèrent une présence d'antigènes proprement plaquettaires, les anticorps ayant été développés pendant les transfusions antérieures.

Mais HARRINGTON et Coll. (59) ont observé des groupes distincts dans les plaquettes à l'aide de 110 variétés des plaquettes ^{nises} au contact de sérums de malades.

Cependant que STEFANINI et coll (60) supposent l'existence d'antigènes de groupe qu'ils auraient détecté à l'aide des sérums humains normaux dans lesquels des anticorps naturels seraient. Ils ont constaté que 6% de ces sérums agglutinent 19% des suspensions plaquettaires et ils concluent à l'existence de 4 groupes correspondant à 2 antigènes différents. Dans 9 autres sérums de malades polytransfusés, ils ont trouvé la présence d'une agglutinine ^{ayant les} caractères d'anticorps. Ils en concluent à l'existence probable de 6 types de plaquettes différents.

VAN LOGHEM, DORFMEIER et VANDERHART (61) ont fait l'étude sérologique des antigènes Z^{wa} sur les plaquettes.

IV ème CHAPITRE.

ANTICORPS ANTI-PLAQUETTAIRES.

LES THROMBO-ANTICORPS.

On sait maintenant detecter diverses substances anti-plaquettaires que l'on peut classer suit:

- I. Thrombo-agglutinines froides
 - a) spécifiques (anticorps naturels du système ABO)
 - b) aspécifiques
- II. Thrombo-agglutinines chaudes
 - ISO-AGGLUTININES IMMUNES.
- III. Thrombo-agglutinines tièdes
- IV. Thrombo-anticorps incomplets
 - a) Iso anticorps immuns
 - b) Auto anticorps immuns
- V. Thrombo-anticorps allergiques.

On peut detecter ces anticorps par diverses techniques.

Ce sont:

- 1) Lyse
- 2) Opsonisation
- 3) agglutination à froid
- 4) agglutination à chaud
- 5) agglutination mixte
- 6) précipitation
- 7) test de COOMBS

DIRECT

INDIRECT

Consommation
de l'antiglob-
uline

agglutination
mixte à
l'antiglobuline

- 8) fixation du complément
- 9) inhibition des fonctions plaquettaires.

de la rétraction du caillot
de la thrombo-plastino-formation

10) in vivo chez les

- a) hommes
- b) les animaux.

1. LES THROMBO-AGGLUTININES

- a) les anticorps naturels du système ABO constitu-
-ant des iso-thrombo-agglutinines naturels.

Elles détectent les antigènes du système ABO présents dans ou sur la surface des plaquettes correspondantes.

Des expériences ultérieures sont nécessaires pour prouver que l'agglutination est bien due à la présence des antigènes A et B sur les plaquettes et non à la fixation des antigènes soluble du plasma. Le tableau (22) montre la présence des anticorps spécifiques même après 8 lavages.

- b) Les thrombo-agglutinines froides aspécifiques.
DAUSSET et MALINVAUD (62) ont décrit dans leur divers articles cette substance décélée grace à leur méthode d'agitation à froid. Cliniquement et étiologiquement, ils n'apparaissent pas responsables de la production de Purpura thrombopénique.

Le tableau (23) montre que dans les purpuras thrombopéniques aigus elles ont été décelées dans 31% de cas mais leur fréquence était très basse dans les purpuras thrombopéniques chroniques. Dans les cas du lupus érythémateux disséminé, ils ont été trouvés dans 41% de cas.

On ne sait si ces substances antiplaquettaires sont véritablement des anticorps et il est possible qu'elles représentent l'analogie des agglutinines froides érythrocytaires. Il est possible également qu'il existe une relation entre un anticoagulant circulant et la thrombo-agglutinine froide. DAUSSET ⁶³ a trouvé dans 4 cas avec un anticoagulant circulant du type anti-thromboplastine, une forte thrombo-agglutinine froide. Tandis que dans aucun cas d'anticoagulant du type antithrombine, anti facteur antihémophilique A ou B, il n'a été trouvé de thromboagglutinines (Tableau 24).

On peut envisager la possibilité que cette agglutination est due à l'action de l'anticoagulant sur les facteurs de la coagulation qui se trouvent à la surface des plaquettes dans l'atmosphère plaquettaire de Roskam.

II. LES THROMBOAGGLUTININES CHAUDES

Nous en discuterons en détail plus loin.

III. LES THROMBOAGGLUTININES TIEDES

Dans certains sérums de malades atteints de syndrome hémorragique, une thromboagglutination a été décelée par la même technique que pour les thromboagglutinines chaudes, mais son optimum thermique se situait à température de laboratoire. ⁶⁴ DAUSSET a observé la présence de cette substance dans deux cas de purpura rhumatoïde atypique, l'un était sans thrombopénie et aucun de ces deux malades n'avait reçu de transfusions. Les substances antiplaquettaires ont disparu en même temps que les troubles. On ignore la signification de ces substances sériques.

IV. LES THROMBO-ANTICORPS INCOMPLETS.

Ils peuvent être fixés sur les propre plaquettes du malade et sont alors décélés par des tests à l'anti-globuline (test de COOMBS plaquettaires direct et consommation direct de l'antiglobuline) ou bien encore libre dans le sérum et alors détectés par le test de Consonnation de antiglobuline (Indirect).

STEFANINI (45) et FLUCKIGER, HASSIG, et KOLLER (46) les vus également trouvé au cours des anémies hémolytiques immunologiques ou encore chez des malades atteints du L.E. .

DAUSSET (47) s'est attaché à étudier les caractères de ces thrombo-anticorps incomplets décélés chez des malades atteints de purpura thrombopénique et jamais transfusés. Leur spécificité anti-plaquettaires a été prouvée. Ils sont inactifs sur les leucocytes. Ils sont passivement absorbés sur plaquettes alors qu'ils ne le sont pas sur leucocytes. Après absorption sur les plaquettes ils peuvent être élués. La réaction est peu influencé par le pH entre le pH 5 et le pH 8. Enfin cette substance se trouve dans les Gama-Globulines (tableau No. 25 où on se trouve une comparaison entre les divers anticorps anti-plaquettaires).

V. THROMBO-ANTICORPS ALLERGIQUES.

Ces anticorps sont produit après une sensibilisation médicamenteuse. Ces médicaments sont :

- 1) La quinidine
 - 2) La quinine
 - 3) Le sédormid
 - 4) La sulfa-mézathine,
 - 5) Divers
 - a) certains dérivés de l'antipyrine,
 - b) l'antazoline,
 - c) les sels d'or
- & etc.

GRANDJEAN (68) , puis ACKROYD (69) en 1948 et 1949 ont montré l'existence des purpuras immunologiques produits par les médicaments.

(1) La quinidine.

SHULMAN (70) a décrit les réactions immunologiques concernant les plaquettes . Il a présenté des représentations stériques et cinématiques, schématisées de la formation d'un complexe formé d'anticorps humains, de quinidine (haptène) et de plaquettes et de la fixation du complément par le complexe.

SHULMAN (71) et (72) dans une autre travail détaillé la réaction immunologique concernant des plaquettes sous l'aspect quantitatifs de l'agglutination plaquettaire, de l'inhibition de la rétraction du caillot et des autres réactions causées par les anticorps du purpura à la quinidine.

HILL TERREL (73) a discuté les immuno-réactions dues à la quinidine sur les plaquettes et la production des anticorps.

⁷⁴ SCHEN, ^{et BARKHAS} TOCANTINS (75) ont aussi observé l'hypersensitivité due à la quinidine entraînant des thrombocytopénies.

BIGELOW , DESFORGES (76), BOLTON, YOUNG (77) HUNT, ANDERSON, et HANLON (78) , JONES, HACKERSIE (79), LARSON (80) NORROSS (81), PERRIN, DAUPHIN, et Mme. DAUPHIN (82), SPIELMANN GATHOF, FRITZCHE (83), ⁸⁵ , STEWART-HESS WEISFUSE, SPEAR et SASS (86) ont étudiés des réactions immunologiques dues à l'administration de quinidine.

2) La QUININE.

GRANDJEAN (47) a observé un purpura hémorragique après l'administration de la quinine et il a même démontré la présence de thrombolytases dans ces cas in vitro.

BOLTON, YOUNG (88) ont trouvé des purpura à la suite d'administration de quinine.

KIESSMEYER-NIELSEN (89) a fait une étude immunologique après l'administration de la quinine ayant entraîné un purpura thrombocytopénique.

STEINKAMP, MOORE et DOUBEK (90) ont trouvé un purpura thrombopénique par l'hypersensibilité de la quinine.

3) Le sédormid.

ACKROYD, (91), (92), (93), (94), (95), (96), a étudié le rôle du sédormid dans la production de purpura thrombopénique et des anticorps allergiques contre les thrombocytes.

GRIFONI, VOLTA et VANACORE (97) ont démontré de l'activité thrombocytolytique du plasma au cours du purpura au sédormid.

KERR GRANT (98) a étudié cette question au point du diagnostic.

MIESCHER et MIESCHER (99) ont trouvé les résultats thrombopénique dans les cas où ont été administré du sédormid.

DAUSSET, BILSKI-PASQUIER et MALINVAUD, et DAVY et TARA (104) ont observé un purpura thrombopénique à l'allyl-isopropyl-acétyl-carbanide et ont observé un syndrome hémorragique par la sensibilisation médicamenteuse.

4) La sulfamézathine.

BOLTON et YOUNG (105) ont observé quelques cas de purpura thrombopénique après l'administration de la sulfamézathine.

5) Divers médicaments.

BERTINO, RODMAN, et MEYERSON (106) ont trouvé les lésions rénales et thrombopénique chez quelques malades qui ont pris DIAMOX (acetazolamide).

DAUSSET ,MALINVAUD¹⁰² , DAUSSET,MALINVAUD,et LAYANI (103) ont étudié des purpuras thrombopéniques d'origine chimique et démontré l'opposition entre les mécanismes allergiques et toxiques dans purpura thrombopénique aigu au phenyl-dimethyl-isopropyl-pyrazolone et on mis en évidence d'une thrombo-agglutinine sérique active seulement en présence du médicament.

RIGENBACH et HIRSCH (105) ont exposé un purpura thrombo-pénique dans les cas avec une administration de methyl-phenyl-succidine.

ROGANTO (106) a montré une immuno-thrombocytopenie à l'hydrazide de l'acide isonicotinique.

DAY,CONARD et MOORE (107) ont signalé la production d'immuno-thrombocytopenie par novo-biocin.

YOUNG¹⁰⁸ a montré une thrombopénie severe après l'administration de buto-barbitone.

RULLIER (109) a contribué à la théorie allergique des purpuras thrombopéniques médicamenteuses .

SHULMAN (110) ont étudié cette question de purpura thrombopénique au point des aspects quantitatifs des immuno-réactions.

V ème CHAPITRE.

LES ISO-THROMBO-AGGLUTININES IMMUNES.

(Travail personnel).

Quelques auteurs ont déjà signalé la présence de THROMBO-AGGLUTININES - IMMUNES.

Nous avons déjà décrit les travaux de HARRINGTON et Coll. (111) et de STEFANINI et Coll. (112) ayant conduit à une description prématurée des groupes et des types plaquettaires.

De même WEINRICH (113) a étudié un grand nombre de cas qui ont reçu plusieurs transfusions. Le sérum de 490 sujets a été examiné ^{par Weinrich} pour la présence d'agglutinines plaquettaires et chez 38 de ces sujets un test de COOMBS sur plaquettes a été fait.

48 sérums provenaient de cas de purpura thrombopénique parmi ceux 110 avaient une réaction d'agglutination plaquettaire positive et é un test de COOMBS sur plaquettes positif;

104 sérums provenaient de cas de purpura thrombopénique secondaires; 24 d'entre eux avaient un test d'agglutination positif tandis que le test de COOMBS sur plaquettes restait négatif dans tous les cas examinés par cette méthode.

Des 88 sérums de malades sans thrombopénie 2 montraient une agglutination plaquettaire positive; celle-ci était due à des iso-anticorps immuns provenant de nombreuses transfusions. Une agglutination plaquettaire faiblement positive fut trouvée dans 2 sérums de sujets normaux; cette propriété était probablement due à des iso-anticorps naturels.

De même SALMON et Coll (114) ont signalé l'association fréquente de leuco et thrombo-anticorps chez les malades polytransfusés.

Enfin LUNDEVALL (115) a étudié des thrombo-agglutinines et a proposé une technique d'agglutination qui fait intervenir comme celle de DAUSSET et COLIN (116) le chauffage préalable de la suspension plaquettaire.

En effet, tous les malades chez lequel ces substances ont été décelées avaient reçu de multiples transfusions. Il apparaît que sur 641 polytransfusées 120 développent des leuco-anticorps, 79 des thrombo-anticorps (tableau 20). Mais, il se trouve que ce sont le plus souvent les mêmes malades qui développent à la fois les leuco et les thrombo-anticorps. Seulement des malades ayant reçu de 1 à 3 transfusions présentent des thrombo-anticorps alors que ces anticorps sont rencontrés chez 57.89% des malades ayant reçu de 101 à 200 transfusions.

L'importance de ces iso-anticorps immuns anti-plaquettaires en pratique transfusionnelle est grande,

a) leur fréquence est en effet extrême.

b) il est probable que la durée de survie des plaquettes compatibles in vitro est plus prolongée que celle des plaquettes incompatibles.

Ceci semble être démontré par le fait que dans certains cas la durée de survie diminue au fur et à mesure que les transfusions sont répétées.

c) il est probable également que certains chocs transfusionnels sont dus à ces anticorps. En effet, chez une malade, qui possédait dans son sérum une iso-thrombo-agglutinine immune active jusqu'au titre 1/512 sur toutes les variétés de plaquettes testées et chez laquelle chaque transfusion était suivie d'un choc très violent, nous avons successivement injecté le plasma dépourvu de plaquettes puis le plasma riche en plaquettes; un choc violent est apparu immédiatement après la deuxième injection.

Nous nous sommes particulièrement attachés à l'étude de ces substances.

Rien ne paraît plus paradoxal que la recherche des substances capables d'agglutiner les plaquettes alors qu'une des fonctions fondamentales des plaquettes est précisément de s'accoler entre elles.

C'est pourquoi nous distinguons nettement:

1) La thrombo-agrégation qui est, sans doute, le premier stade de la métamorphose visqueuse. Celle-ci est vraisemblablement due à des traces de thrombine et à un facteur dialysable BOU NAMEAUX (118) et LUSCHER (119). De même la thrombo-agrégation semble due à la persistance dans certains sérums de traces de thrombine. Le phénomène en effet est particulièrement net quand on utilise du sérum normal séparé quelques minutes seulement après la coagulation. Il n'est pas aboli par le chauffage du sérum à 56°C, ni par son passage sur une résine échangeuse de cation. Il est par contre totalement aboli par absorption du sérum par le sulfate de baryum ou le phosphate tricalcique. La thrombo-agrégation n'est pas un phénomène immunologique.

2) La thrombo-agglutination au contraire n'est inhibée, ni par le chauffage du sérum à 56°C, ni par le passage sur résine échangeuse de cation ni surtout par absorption par le sulfate de baryum ou le :

phosphatocalcique. Elle n'est observée qu'avec certains sérums pathologiques. Elle est donc, selon toute vraisemblance un phénomène immunologique. (Tab no 1),

.....

VI ème CHAPITRE.

T E C H N I Q U E .

Nous avons mis au point une nouvelle technique qui est une modification de la technique d'agglutination par agitation circulaire décrite par DAUSSET et MALINVAUD (11). L'élimination de la cause d'erreur principale, due à la thrombo-agrégation, est obtenue par le chauffage de la suspension plaquettaire pendant quelques secondes à 56°C, chauffage qui probalement détruit certains facteurs de la coagulation compris dans l'atmosphère des plaquettes (DAUSSET et COLI (12)).

MATERIEL et METHODE.

254 sérums normaux et 1633 sérums pathologiques ont été étudiés. Parmi ces derniers on compte 641 sérums de malades ayant reçu au moins une transfusion. On compte également 263 sérums de malades thrombopéniques dont 116 atteints de purpura thrombopénique idiopathique.

TECHNIQUE DE THROMBO-AGGLUTINATION A 37°C.

Toutes les manipulations sont réalisées en verrerie siliconée à +4°C.

PREPARATION DU SERUM A ETUDIER.

Le sérum doit être utilisé inactivé par chauffage de 30' à 56°C. Il doit être déprothrombiné par passage sur SO⁴Ba. pour ce faire 1 ml de sérum inactivé est mis au contact (pendant 15 minutes avec agitation constante à la température de laboratoire avec 0,10 gr de SO⁴Ba.

PREPARATION DE LA SUSPENSION PLAQUETTAIRE.

La suspension de plaquettes est préparée à partir de 9 volumes de sang normal de groupe O, ou compatible avec le sérum à étudier, prélevé sur un volume de E.D.T.A. (sequestrène Na² à 5%) en tube siliconé. Le sang est centrifugé 10' à 1000 tours /minute de façon à obtenir une suspension de plaquettes dans leur propre plasma, cette suspension est ensuite centrifugée 30 minutes à 3000 tours /minute; les plaquettes sont lavées 3 fois avec la solution suivante:

Tamp { PO⁴Na² à 9,40 gr. pr. 1000 en eau physiologique.....4Volum.
 -on. { PO⁴H²K à 9,066 gr. pr. 1000 en eau physiologique;;....1Volum.
 { Eau physiologique.....20Volum.

Sequestrène Na². 3,30 gr. pour un litre de tampon.

Chaque centrifugation au cours des lavages se fait à 3000 tours

minute pendant 10 minutes. Au 2ème lavage, les plaquettes sont remises en suspension dans l'eau de lavage comme précédemment, de façon à obtenir la concentration de 900.000 plaquettes/mm³ environ. Cette suspension est chauffée au bain-marie en tube siliconé, par fraction de 0,5 ml, pendant un temps précis de 16-17 secondes à 56° C. Après le chauffage, on effectue le 3ème lavage. Le culot plaquettaire ainsi obtenu est resuspendu dans un mélange de sérum AB frais : 1 vol. ; eau physiologique : 3 volumes (le sérum AB est absorbé à 4° C sur plaquettes fraîches, il peut être ainsi au congélateur, et adsorbé sur SO₄ Ba au moment de l'emploi). Des épreuves préliminaires détermineront le temps utile de chauffage qui peut varier d'une variété de plaquettes à l'autre. On utilisera le temps qui permet d'obtenir des résultats nettement négatifs avec les sérums possédant des thrombo-agglutinines.

Réaction proprement dite.

Dans un godet d'une plaque de KLINE (* Fig. 1) non siliconée, on met 0,10 ml de sérum à étudier et 0,5 ml de suspension plaquettaire. Après 30' d'agitation circulaire sur un agitateur de KLINE placé à l'étuve à 37° C et parcourant 110 rotations par minute de 4 cm de diamètre, la lecture se fera directement sur la plaque avec grossissement de 90 fois environ. La réaction est traduite selon la taille des agglutinants par ++++ (microscopique) ...,++ ; +, ±, et négatif (Fig. 2, 3).

I. ETUDE DES MODALITES DE LA REACTION -

1°- Préparation du sérum.

Les sérums à étudier doivent subir une préparation tendant à éliminer les facteurs. Ont été proposées :

a) l'inactivation par chauffage de 30 minutes à 56° C qui détruit les facteurs thermolabiles de la coagulation et du complément.

* Agitateur de KLINE et plaques à godets concaves de chez COGIT, Bd St-Michel, PARIS.

b) L'adsorption du sérum par le sulfate de baryum ou le phosphate tricalcique, qui élimine les facteurs absorbables de la coagulation qui peuvent demeurer encore dans le sérum.

Le sérum ne doit pas être séparé du caillot immédiatement après la coagulation surtout s'il existe des troubles de la coagulation. Le passage sur résine échangeuse d'ions apparaît une précaution superflue.

2°- Préparation de la suspension plaquettaire.

a) Le lavage des plaquettes répond à deux nécessités :

- . éliminer le plasma sequestréné qui entoure les plaquettes,
- .. éliminer une partie de l'atmosphère plaquettaire.

Le sequestrène Na^2 a une nette action inhibitrice de l'agglutination.

- . Pour éviter une agrégation irréversible, l'eau de lavage doit contenir une petite quantité de sequestrène. Au dernier lavage, les plaquettes sont resuspendues en eau physiologique ne contenant pas de sequestrène Na^2 .

.. La température optima des lavages est aux alentours de $+ 4^\circ \text{C}$.

... Le nombre des lavages influence peu la réaction (Tableau 2).

b) Le chauffage de la suspension plaquettaire à 56°C .

Aucune possibilité de fausses réactions positives dues aux facteurs de la coagulation ne semblait plus devoir persister. Mais ceux-ci sont tous présents dans l'atmosphère plaquettaire de ROSKAN et persistent comme l'a montré BOUNIEAUX (121) après de multiples lavages, un traitement devait donc être appliqué aux plaquettes afin d'éliminer les facteurs de coagulation se trouvant dans l'atmosphère et capables à eux seuls de provoquer la thrombo-aggrégation.

Après avoir effectué des traitements chimiques (acide tannique, acide osmique), enzymatiques (trypsine, papaïne), nous nous sommes arrêtés à un traitement physique : le chauffage de la suspension plaquettaire pendant quelques secondes à 56° C. Des études ultérieures apprendront sans doute la nature exacte de la ou des substances qui sont détruites au cours du chauffage de la suspension plaquettaire. Certains arguments laissent penser qu'il peut s'agir du fibrinogène car :

- a) des plaquettes afibrinogénémiques se comportent comme des plaquettes normales chauffées. *
- b) un plasma normal chauffé quinze à dix-huit secondes et, secondairement additionné de thrombine ne coagule qu'en un temps très long (deux heures environ) alors que, non chauffé, il coagule dans les mêmes conditions en quelques secondes.

Néanmoins, d'autres arguments vont à l'encontre de cette hypothèse :

- a) Le chauffage de la suspension plaquettaire pendant deux heures à 37° C, qui théoriquement n'altère pas le fibrinogène, entraîne des résultats voisins mais cependant moins nets que le chauffage de quinze à dix-huit secondes à 56° C.
- b) Les plaquettes chauffées pendant quinze à dix-huit secondes sont agglutinées comme auparavant par un sérum antifibrinogène.
- c) Les plaquettes chauffées et étudiées immuno-chimiquement contiennent la même quantité de fibrinogène.

* Nous remercions le Docteur M. SELIGMANN d'avoir bien voulu apporter son assistance pour cette partie de travail.

Il est donc probable que le chauffage des plaquettes altère d'autres éléments labiles de la coagulation et, en particulier, l'accélélerine.

Notons qu'un chauffage dépassant quinze ou dix-huit secondes est néfaste à la réaction d'agglutination. Il est probable que le chauffage altère alors les substances réagissant avec les thrombo-agglutinines plaquettaires. La marge entre la destruction des facteurs responsables de la thrombo-agrégation et la destruction de la substance réagissant avec les thrombo-agglutinines est très faible. A 56° C par exemple, cette marge n'est que de quelques secondes.* (Tableau 3).

Le moment de l'emploi de la suspension par rapport au moment du chauffage est important. Il a été remarqué qu'il fallait la laisser reposer après le chauffage pendant 45 minutes à la température du laboratoire avant de l'utiliser.

Les plaquettes peuvent être utilisées pendant 24 heures après leur prélèvement à condition d'être gardées en tube siliconé à 4° C en suspension dans leur propre plasma.

3°- Influence de l'agitation.

L'agitation circulaire de la réaction est un facteur favorisant. Dans le cas de réaction très forte, l'agglutination survient sans agitation. Mais celle-ci devient indispensable dans le cas de réaction plus faible.

a) Le temps optimum d'agitation paraît être de 30 minutes. En effet si dans le cas d'agglutinines puissantes la réaction est apparue dès les premières minutes, il est préférable de poursuivre plus longtemps dans le cas d'agglutinines faibles. Au-delà de 30 minutes, l'intensité de la réaction reste identique (Tableau 4).

* Selon une autre hypothèse, le chauffage de la suspension plaquettaire conduirait à la destruction du complément probablement présent dans l'atmosphère plaquettaire.

b) La vitesse de la rotation paraît influencer la sensibilité de la réaction : 110 rotations par minute (tableau 5). Néanmoins pour des raisons pratiques (risques d'extravasation au cours de l'agitation) nous avons adopté en routine cette dernière vitesse.

c) Le diamètre de la rotation n'a pu être étudié par manque d'appareil adéquat. Mais il paraît évident que le rayon doit être tel que le liquide est entraîné à la périphérie de la goutte afin d'assurer un mouvement permanent.

4°- Influence du nombre des plaquettes dans la réaction.

Le nombre optimum de plaquettes pour une réaction intense et facilement lisible est, tout au moins dans les conditions d'expériences définies par ailleurs, de 800.000 et 900.000 par mm³ dans la suspension plaquettaire. Au-delà de ce chiffre la réaction devient difficilement lisible. Au-deçà, elle s'affaiblit ou devient négative (Tableau 6).

5°- Autres facteurs.

L'emploi de verrerie siliconée est d'une grande importance pendant la préparation et la conservation de la suspension plaquettaire. Par contre, les plaques de l'agitateur de KLINE ont avantage à ne pas être siliconées pour permettre à la goutte de s'étaler sur le verre et ainsi de subir les mouvements de l'agitateur.

II. ETUDE DES CARACTERES DE LA SUBSTANCE ANTI-PLAQUETTAIRE -

1°- Thermostabilité. La substance antiplaquettaire décelée par cette technique est thermostable ; elle résiste au chauffage de 30 minutes à 56° C. Elle est affaiblie par un chauffage de 6 heures et détruite après 4 heures à 56° C. De même, un chauffage de 1 heure à 60° C ou de 10 minutes à 70° C l'affaiblit alors qu'un chauffage de 4 h. à 60° C ou de 30 minutes à 70° C la détruit (tab.7).

2°- Optimum thermique. Les substances thrombo-agglutinantes décelées par cette méthode sont nettement plus actives à 37° C qu'à 18° C ou à 4° C (Tableau 8). Pour cette étude, les différents ingrédients de la réaction, ainsi que la verrerie, ont été préalablement portés à la température voulue.

3°- Optimum de pH. La réaction n'est observée que dans une gamme de pH très étroite comprise entre 2,6 et 5. Dans les pH acides, les sérums contrôlés provoquent de fausses réactions positives (Tableau 9).

4°- Optimum d'ionisation. En hypertonie, à partir de 12 gr. pr 1 000 de Cl Na la réaction devient faussement positive avec les sérums de contrôle ; les plaquettes forment alors des amas déchiquetés qui n'ont rien de comparable avec les agglutinations arrondies et homogènes observées avec les thrombo-agglutinines. En hypotonie, à partir de 4 gr pour 1000 de NaCl dans le milieu de dilution de fausses réactions positives sont également observées (Tableau 10).

5°- Influence du milieu de dilution et du complément. Le titre obtenu en eau physiologique ou en sérum humain normal inactivé ou en sérum additionné d'albumine humaine au 1/5 de son volume est identique (Tableau 11).

Par contre, quand on introduit dans la réaction une quantité suffisante de sérum frais on obtient un effet inhibiteur. En effet : on observe avec les thrombo-agglutinines immunes le même phénomène qu'avec les leuco-agglutinines. Il existe dans le sérum normal frais une substance inhibitrice de l'agglutination. Cette substance a pu, pour les leuco-agglutinines, être identifiée à l'un ou à plusieurs des composants du complément (COLOMBANI et DAUSSET 1922). On verra, dans les tableaux (2, 12A) que la réaction est complètement inhibée quand tous les ingrédients (sérums thrombo-agglutinants, milieu de dilution, milieu de suspension plaquettaire) sont frais, qu'elle l'est moins quand la quantité de sérum diminue et qu'elle est à son maximum quand tous les sérums sont inactivés ou remplacés par de l'eau physiologique. L'influence du complément a pu être étudiée plus en détail.

L'optimum est obtenu quand $1/12$ du liquide de suspension, représentant la réaction finale, contient une faible quantité de sérum humain frais. Quand la quantité de sérum frais représente $1/2$ de la réaction finale, la thrombo-agglutination devient négative.

6°- Effet de zone. Un effet de zone peut être observé dans deux circonstances :

a) avec des quantités décroissantes de complément, quand il existe dans les premières dilutions une forte quantité de sérum frais et que celle-ci diminue ensuite au fur et à mesure des dilutions. En effet (Tableau 13) une prozone apparaît chaque fois que le sérum est utilisé frais et dilué soit en saline, tamponné, soit en sérum inactivé, et elle est d'autant plus marquée que la suspension plaquettaire est elle-même constituée de sérum frais.

Il est probable que ce premier effet de zone est en rapport avec une lyse partielle des plaquettes due à la présence du complément. Il n'est pas rare d'observer alors que les plaquettes prennent un aspect pâle et perdent leur réfringence.

b) Sans complément avec certains sérums même après inactivation, la réaction est négative ou faible dans les premières dilutions. Elle devient nettement positive aux dilutions du $1/4$ et parfois $1/8$ pour devenir négative. Le mécanisme de ce dernier effet de zone n'est pas clair. Trois hypothèses peuvent être soulevées :

1) Le rapport antigène-anticorps n'est pas à son optimum dans les premières dilutions. Il pourrait s'agir d'un excès d'anticorps. Néanmoins, on ne comprend pas pourquoi les anticorps apparemment les plus faibles (à en juger par le titre) provoquent très fréquemment l'apparition d'une zone.

2) Un mélange d'anticorps complets et incomplets pourrait rendre compte de l'effet de zone. Les anticorps incomplets, plus avides que les anticorps complets, se fixeraient les premiers sur les antigènes ne permettant plus l'action des anticorps agglutinants. Mais la sensibilisation des plaquettes dans les premières dilutions n'a pas été prouvée : elles consomment l'antiglobuline mise à leur contact après 8 lavages.

3) Malgré l'absence thermique de complément dans la réaction (sérum inactivé et plaquettes lavées), il faut peut-être évoquer une troisième possibilité : l'antagonisme lysine-agglutinine comme au paragraphe précédent (a). En effet, on sait que l'atmosphère plaquettaire est un reflet des constituants plasmatiques et il est probable, quoique non prouvé, qu'elle contient également du complément. Dans les premières dilutions la lysine suffisamment puissante pour agir grâce au complément présent dans l'atmosphère plaquettaire et cette lyse partielle empêcherait l'agglutination.

7°- Fractionnement du sérum. Les sérums ont été fractionnés selon la méthode de DUBERT et Coll. ¹²³ et la substance thrombo-agglutinante a été régulièrement trouvée dans la fraction gamma globulinique, néanmoins à un titre moindre que dans le sérum non fractionné, aucune globuline n'a été trouvée aussi bien dans la ^{L₁ et L₂} fraction que dans les albumines (Tableau ¹⁴).

8°- Autres méthodes de détection de ces substances anti-plaquettaires.

a) La lyse a été étudiée entre lame et lamelle. L'action directe du sérum frais ou recomplémenté sur certaines variétés de plaquettes entraîne l'apparition de signes de dégénérescence, puis la disparition plus ou moins complète des plaquettes.

b) La précipitation. Les sérums thrombo-agglutinants se sont montrés incapables de provoquer la précipitation d'un extrait plaquettaire, que les plaquettes aient été détruites par ultra-sons ou par congélation -décongélations successives (Dr SELIGMANN ¹²⁴).

c) La fixation du complément. Par contre, la thrombo-agrégation et la réaction de fixation du complément provoquent des réactions sensiblement parallèles (Tableau ¹⁵). Il apparaît que la fixation du complément est moins sensible que la thrombo-agglutination, ne décelant que les substances anti-plaquettaires les plus puissantes (Dr SELIGMANN ¹²⁵).

d) Les tests de COOMBS indirects.

1- pratiqués par agglutination des plaquettes sensibilisées par la substance antiplaquettaire. Cette réaction n'a jamais entre nos mains donné de résultats satisfaisants.

2- pratiqués par la consommation de l'antiglobuline. Chaque fois qu'il existe une thrombo-agglutinine immune puissante, on observe une consommation de l'anti-globuline. Ces deux réactions semblent déceler la même substance tout au moins dans les cas où nous l'avons recherchée, puisque le titre est apparu être sensiblement le même avec les deux techniques (Tableau 16).

3- pratiqués par l'agglutination mixte par l'antiglobuline des plaquettes sensibilisées et d'hématies recouvertes d'anticorps anti-D incomplets. Cette étude a été faite en collaboration avec R.R.A. COOMBS et D. CHALMERS ^{et DOUSSET} (126) une corrélation étroite entre la thrombo-agglutination et l'agglutination mixte par l'antiglobuline a été trouvée.

e) Les tests d'inhibition des fonctions plaquettaires.

THROMBELASTOGRAPHIE. Cette étude a été faite en collaboration avec SAMAMA, LEROUX, PROST, et MARCHAL (127). Il a été observé que les sérums thrombo-agglutinants inactivés et passés sur SO_4Ba mélangés à 37° C en présence de C' avec un plasma riche en plaquettes normales provoquent une nette diminution de l'amplitude (constante a) du thrombélastogramme (figure 1).

9°- Etude de la spécificité.

a) Spécificité selon la variété de plaquettes.

1- Dans tous les cas où cette épreuve a été tentée, le sérum des malades possédant des thromboagglutinines est resté inactif sur leurs propres plaquettes.

2- Les substances thrombo-agglutinantes ont été testées contre un certain nombre de variétés de plaquettes de groupe ABO compatible. Certains sérums se sont montrés capables d'agglutiner toutes les variétés testées, d'autres au contraire n'agglutinaient qu'un nombre plus ou moins grand de variétés (Tableau 17).

Nous avons tenté de trouver des identités entre différents sérums agglutinants en dehors des sérums agglutinants toutes les variétés de plaquettes testées. Nous n'avons pas non plus trouvé deux sérums complémentaires, c'est-à-dire provoquant des réactions systématiquement opposées.

De même, nous avons recherché vainement deux variétés de plaquettes réagissant d'une manière identique ou systématiquement opposée avec tous les sérums thrombo-agglutinants dont nous disposons.

b) Spécificité selon les différents éléments du sang.

1- Corrélation avec les substances anti-hématies. Aucune corrélation entre les substances anti-plaquettaires et anti-hématies n'a été trouvée.

- Malgré que la présence de l'antigène D ait été démontrée sur des plaquettes des sangs Rh+ (D+) les sérums qui possèdent des anticorps anti-D par exemple sont incapables par notre technique d'agglutiner les plaquettes. Il en est sans doute de même pour les autres anticorps immuns anti-érythrocytaires.

- Inversement, les sérums qui possèdent les thromboagglutinines immunes sont incapables, en l'absence d'un anticorps spécifique anti-érythrocytaire, d'agglutiner les hématies quels que soient les antigènes dont elles sont pourvues. Des absorptions faites à 37° C sur hématies provenant d'un sang défibriné, c'est-à-dire dépourvu de plaquettes (5 passages successifs) n'ont pas altéré le titre de la thrombo-agglutinine.

2- Corrélation avec les substances anti-leucocytes.

La corrélation entre les substances anti-plaquettaires et anti-leucocytaires décelées à 37° C est au contraire très étroite. Plusieurs faits doivent être soulignés :

- Les substances anti-plaquettaires sont le plus souvent décelées dans les mêmes sérums que les substances anti-leucocytaires, quoique les substances anti-leucocytaires soient plus fréquentes que les substances antiplaquettaires (Tableau 17).

- L'identité ou la non identité entre les deux substances devait donc être étudiée.

= Ce problème a été abordé, tout d'abord par l'étude parallèle des réactions de leuco et de thrombo-agglutination des plaquettes et des leucocytes d'un même sang provenant de donneurs normaux ("panel"). Dans la majorité des cas, un parallélisme a été obtenu entre les réactions leucocytaires et plaquettaires quoique le titre soit toujours plus bas sur plaquettes que sur leucocytes. Avec les sérums puissants, les réactions sont positives à la fois sur toutes les variétés de leucocytes et de plaquettes testés. Par ailleurs, le sérum Cr qui nous a servi pour définir le système MAC a donné des réactions identiques sur plaquettes et sur leucocytes. L'antigène MAC semble donc présent sur les plaquettes humaines chez 50 à 60 % des individus sans relation familiale dans la population française. Cependant, il y a de nombreux sérums anti-leucocytaires faibles qui provoquent l'agglutination des leucocytes sans provoquer l'agglutination des plaquettes. Il est vraisemblable que la sensibilité du test plaquettaire est moindre et que l'on ne parvient pas à déceler une action anti-plaquettaire.

= Le problème de l'identité des deux substances a été également abordé par des épreuves d'absorption croisée. Des sérums thrombo et leuco-agglutinants ont été absorbés au cours des deux expériences sur un "pool" de plaquettes et de leucocytes provenant d'individus normaux et isolés à partir de la crème obtenue sur les séparateurs centrifuges du CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (MAUPIN et Coll. 124). Cinq absorptions successives ont été pratiquées : 1 ml de sérum absorbé a été mis en contact avec 34 milliards de plaquettes ou de 1.320.000 leucocytes. La première absorption a été faite pendant 30 minutes à 37° C puis 12 heures à 4° C. Les absorptions suivantes ont été faites par contact de 1h.30 à 37° C. Après chaque absorption, les culots ont été élués en ajoutant au culot de plaquettes ou de leucocytes lavés trois fois, une quantité d'eau physiologique tamponnée égale au 1/5 du sérum absorbé. Le mélange a été chauffé 15 minutes à 56° C, centrifugé rapide-

ment à chaud, l'éluat est décanté. Les eaux de lavage ont été testées en même temps que les différents absorbats et éluats sur des plaquettes et leucocytes normaux incompatibles. Les résultats de la première expérience sont résumés dans les Tableaux 18 et 19. Ils montrent que, pour le sérum puissant Mo (Tableau 18), cinq absorptions sur leucocytes ont été nécessaires pour absorber totalement l'anticorps leucocytaire alors que deux absorptions sur plaquettes suffisent pour absorber l'anticorps anti-plaquettaire. Cette même différence se retrouve pour l'absorption de l'anti-plaquettes sur leucocytes et de l'anti-leucocytes sur plaquettes. Les éluats correspondent aux absorptions mais un titre d'au moins 1/16 de l'anticorps anti-leucocytaire et d'au moins 1/4 de l'anti-corps antiplaquettaire est nécessaire pour qu'une élution soit possible. Avec le sérum faible Dr (Tableau 19), une seule absorption a suffi pour absorber les substances anti-plaquettaires et antileucocytaires, seuls les éluats de plaquettes ont été positifs.

Les résultats de la deuxième expérience sont résumés sur les figures 5 et 6. On voit que, aussi bien pour le sérum Dr que pour le sérum Mo, le passage sur plaquettes a permis l'absorption des deux substances anti-plaquettaires mais aussi anti-leucocytaires. Ces deux substances sont restituées au cours de l'élution. Par contre, le passage sur leucocytes n'a permis qu'une absorption partielle des anticorps. La partie absorbée est restituée au cours de l'élution. Il ressort de ces deux séries d'expériences qu'il est possible d'absorber les deux substances à la fois sur leucocytes et sur plaquettes, mais moins facilement sur leucocytes que sur plaquettes.

Il est très probable que cette différence de comportement des leucocytes et des plaquettes peut s'expliquer plus par des différences quantitatives que qualitatives. D'une part, la surface d'absorption offerte par les plaquettes est sans doute plus large. Par ailleurs, les leucocytes sont certainement plus fragiles, plus altérés que les plaquettes par les manipulations qui précèdent l'absorption.

Il n'en ressort pas moins que ces épreuves ne permettent pas de trouver des différences de spécificité et sont donc en faveur d'une identité des deux substances.

Des épreuves analogues ont été faites avec le sérum Du sur des plaquettes et des leucocytes provenant d'un sujet atteint de leucémie myéloïde. Les résultats obtenus (Figure n° 7) diffèrent des précédents. En effet : si les plaquettes absorbent comme précédemment à la fois l'anti-plaquettes, pourtant de titre plus faible, d'après cette épreuve il semblerait donc qu'il existe bien deux substances au moins dont l'une a une activité à la fois anti-plaquettes et leucocytes et l'autre antiplaquettes seulement. Ces conclusions ne sont pas apparemment conciliables avec celles des épreuves précédentes et tendraient à prouver qu'il existe des antigènes spécifiques plaquettaires et d'autres spécifiquement leucocytaires.

Cependant, on sait que les leucocytes leucémiques sont des éléments immatures sur lesquels manquent certains antigènes (SELIGMANN 1944). Il est possible que les leucocytes du malade sur lequel l'absorption a été faite possèdent un des antigènes en commun avec les plaquettes mais ne possèdent pas un autre antigène qui, néanmoins, était présent sur les plaquettes correspondantes : celles-ci ayant un degré normal de maturité.

Une autre expérience faite avec le sérum Cr (anti-MAC) est encore plus difficile à interpréter (figure n° 8) car les leucocytes provenant du même malade atteint de leucémie myéloïde chronique n'étaient pas agglutinés par ce sérum qui, pourtant, agglutine 50 à 60 % des variétés de leucocytes testés. Ici encore, les leucocytes leucémiques n'ont pas absorbé l'anti-plaquettes.

10°- Corrélation avec les autres variétés de substances antiplaquettaires.

a) Les substances anti-plaquettes décelées par consommation de l'anti-globuline chez les polytransfusés.

La thrombo-agglutination et la consommation de l'antiglobuline ont été pratiquées en parallèle à l'aide des mêmes variétés de plaquettes normales, sur des malades polytransfusés ou sur des sérums de malades atteints de purpura thrombopénique idiopathique.

On trouve chez ces malades des substances provoquant la consommation de l'antiglobuline sans toutefois provoquer l'agglutination. Il existe donc des substances antiplaquettaires de constitution gamma-globulinique qui se fixent sur les plaquettes sans que cette fixation se traduise par une agglutination. Ces substances sont rencontrées essentiellement chez les malades atteints de purpura thrombopénique idiopathique aigu ou chronique même en l'absence d'antécédents de transfusion ou de grossesse, ^{Tab. 1.21} mais aussi sans doute chez des malades polytransfusés.

b) Les thrombo-agglutinines froides actives à 4° C. Il ne semble exister aucune corrélation entre cette activité de substances anti-plaquettaires et les thrombo-agglutinines actives à 37° C. On aura donc soin dans le cas où il existe une thrombo-agglutinine active à froid, de chauffer à 37° C la verrerie, le sérum et la suspension plaquettaire avant de mettre en contact les divers réactifs. La thrombo-agglutinine froide ne pourra ainsi se manifester.

c) Les thrombo-agglutinines froides actives à 18° C sont rares et n'ont jamais été rencontrées dans les mêmes sérums que les thrombo-agglutinines chaudes. Elles peuvent constituer, comme les thrombo-agglutinines froides, une cause d'erreur dans la recherche des thrombo-agglutinines chaudes.

11°- Corrélation avec la clinique.

a) Sérums normaux. Aucun des 252 sérums normaux que nous avons examinés ne contenait de thrombo-agglutinines chaudes. Nous n'avons examiné qu'un nombre restreint de sérums de femmes multipares mais il est probable que, comme pour les leuco-agglutinines, des thrombo-agglutinines seront également découvertes dans ces sérums.

b) Sérums pathologiques. Nous avons étudié un total de 1633 sérums de malades divers. Nous en avons trouvé 87 positifs. Il ne semble pas y avoir de relation entre la positivité et le nombre des plaquettes. Purpuras thrombopéniques idiopathiques ont été étudiés. Seul un résultat positif a été enregistré. Par contre, le rôle des transfusions dans l'apparition des thrombo-agglutinines actives à 37° C apparaît prépondérant. En effet, tous les sérums qui possédaient cette substance provenaient de malades ayant reçu de nombreuses transfusions (Tableau 20). Sur un total de 641 malades transfusés (c'est-à-dire ayant reçu au moins une transfusion) étudiés consécutivement, on trouve 79 thrombo-agglutinines soit 12,32 %. Mais si l'on isole les malades ayant reçu de 101 à 200 transfusions, ce pourcentage passe à 47,36 %. Sur 87 malades, on compte 61 femmes et 26 hommes. Il y a donc une nette prédominance féminine, peut-être due aux immunisations par grossesse (7 enfants, 17 femmes ayant eu des grossesses et 25 dont on ne connaît pas l'histoire obstétricale. Dans deux cas, des thrombo-agglutinines sont survenues au cours de chorion-épithélioma et des agglutinines étaient actives contre les thrombocytes du mari. Il apparaît qu'il existe un rapport étroit entre les thrombo- et les leuco-agglutinines. En effet dans tous les cas à côté des thrombo-agglutinines que nous avons détectées jusqu'à ce jour, il existait également des leuco-agglutinines. Mais les leuco-agglutinines sont plus fréquemment détectées que les thrombo-agglutinines puisqu'on en observe environ 1/4 de plus. Dans 46 sérums, en effet, il existait une leuco-agglutinine, faible il est vrai, sans thrombo-agglutinine. Cette différence peut tenir soit à une antigénicité plus grande des leucocytes, soit à une sensibilité moindre de la technique de détection des thrombo-agglutinines.

c) Chocs transfusionnels. Comme pour les leuco-anticorps (130), il est probable qu'un grand nombre de chocs transfusionnels sont dus au conflit entre les substances sériques anti-plaquettaires et les plaquettes transfusées.

Nous avons étudié un cas caractéristique. Chez une malade qui possédait des substances thrombo- et leuco-agglutinantes de titre élevé (1/512) et qui présentait à chaque transfusion des chocs violents, nous avons injecté successivement 150 ml de plasma dépourvu de plaquettes, puis 2 h. plus tard 50 ml du même plasma contenant cette fois les plaquettes correspondantes. Un violent frisson avec élévation de la température est apparu dès la fin de cette deuxième injection (130).

VII ème CHAPITRE.

D I S C U S S I O N

D I S C U S S I O N

La nature des substances anti-plaquettaires que nous avons décelées par la technique ^{que} nous proposons demande à être discutée.

1) Ce sont probablement des anticorps.

Leur nature d'anticorps est très probable. En faveur de cette hypothèse on peut ~~retenir~~ avant tout leur spécificité pour les plaquettes humaines. Par ailleurs ces substances sont thermostables et se trouvent dans la fraction gamma-globulinique du sérum.

2) Ce sont des anticorps innés dont elles possèdent les caractères. Elles n'existent pas dans le sérum humain normal mais apparaissent après des stimulation (transfusions et sans doute grossesses). Elles ont un optimum d'action à 37°C.

3) Ce sont des iso-anticorps car elles sont inactives sur les propres plaquettes des malades mais ^{actives} sur certaines variétés de plaquettes. Dans ce cas quel est l'antigène plaquettaire (ou présent à la surface des plaquettes) contre lequel cet anticorps est dirigé?

1) On peut se demander si cet antigène ne serait pas le fibrinogène dont on connaît la présence sur et probablement dans les plaquettes. Dans ces cas on devrait supposer qu'il existe des groupes de fibrinogène, ce qui n'est nullement démontré. On peut trouver un argument contre l'hypothèse d'un anti-fibrinogène dans la réduction de l'amplitude (a) du tracé thrombo-élastographique obtenu par coagulation d'un plasma riche en plaquettes en présence du sérum thrombo-agglutinant qui n'est plus observé en l'absence de plaquettes. L'action ne se manifeste donc pas sur le fibrinogène plasmatique.

2) Il est plus logique de penser que les anticorps sont dirigés contre des substances spécifiques de groupe qui font partie intégrante de la substance plaquettaire, et qui ne sont pas par conséquent absorbés à leur surface. On peut donc affirmer dès maintenant qu'il existe des groupes plaquettaire.

indépendant de ceux des érythrocytes . Des études ultérieures sont nécessaires pour connaître les rapports de ces groupes plaquettaires avec les groupes leucocytaires également indépendants de ceux des érythrocytes. Nos premières constatations semblent montrer qu'il y a des antigènes communs aux plaquettes et aux leucocytes. Par exemple l'anti-MAC décrit dans les leucocytes existe également dans les plaquettes. De même que pour les leucocytes il ne semble pas exister un antigène nettement plus antigénique les autres et d'une fréquence telle qu'il donne naissance à des anticorps bien définis plus fréquemment rencontrés que les autres . On arrive pour les plaquettes ,à penser de même que pour les leucocytes ,qu'elles sont porteuses ,d'une grande quantité d'antigène,d'antigénucité voisine et de fréquence suffisamment grande pour qu'une sensibilisation faite à l'aide de multiples variétés de plaquettes aboutisse à l'apparition d'anticorps actifs sur la plupart des variétés des plaquettes testées,à l'exception ,bien entendu des propres plaquettes du malade. Il est vraisemblable que même si on utilisait pour sensibiliser un individu le sang d'un seul donneur on obtiendrait un résultat voisin: les divers antigènes présent à la surface de cette seule variété de plaquettes utilisées étant suffisant pour provoquer une sensibilisation contre beaucoup d'entre eux,absents chez le receveur.

En ce qui concerne les anticorps ,les analogies ne sont pas moins grandes. La même diversité des anticorps ,dont aucun n'apparaît semblable ou complémentaire avec un autre ,est observée dans les deux lignées.

En fin l'analogie entre les anticorps anti-leucocytes et plaquettaires peut être poussée plus loin; même système inhibiteur thermolabile absorption croisée sur des "pool" de leucocyte et de plaquettes normaux . On est donc tenté de penser que les thrombo-agglutinines et leuco-agglutinines ne forment qu'une seule et même substance. Néanmoins des différences sont notées:

a) le phénomène de zone observée avec sérum inactivés est beaucoup plus fréquent avec les thrombo qu'avec les leuco-agglutinines.

b) l'inhibition par le complément est obtenue avec une dose beaucoup plus faible de complément.

c) la dissociation des deux substances a été possible par $\bar{a}$ l'absorption croisée sur les leucocytes et les plaquettes d'un individu atteint de leucémie myéloïde chronique (figure 7+8) . Mais cette dissociation peut être due :

i) à ce que les leucocytes utilisés, considérés comme des leucocytes normaux ne possédaient pas l'antigène plaquettaire contre lequel existait un anticorps dans le sérum.

é) ou bien à ce que les leucocytes leucémiques immatures n'avaient développé qu'un des deux (au moins deux) antigènes contre lesquels des anticorps existaient dans le sérum à tester. Nous ne pouvons en effet qu'être frappés par le fait que les trois expériences d'absorption que nous avons pratiquées avec des myélocytes leucémiques ont toutes les trois conduit à la déduction que ces cellules étaient dépourvues d'un antigène présent sur les plaquettes correspondantes. Ainsi la séparation par absorption sur leucocytes leucémiques ne signifie pas forcément que les thrombo et les leuco-anticorps sont des substances distinctes. Il peut s'agir d'une différence de développement de certains antigènes sur des éléments leucocytaires immatures et sur des éléments plaquettaires apparemment normaux.

L'existence des iso-anticorps anti-plaquettaires a déjà été publiée par STEFANINI et COLL (132) ainsi que par HARRINGTON et Coll. (133) qui ont même décrit des groupes et des types plaquettaires. De même WIEGER, JAGER et VAN LOGHEN (134) ont ils trouvé des tests de COOMBS plaquettaires indirects plus fréquemment positifs chez les polytransfusés; ANDRE , DREYFUS, et SALMON (135) , (136) ont ils rencontrés des substances anti-plaquettaires accompagnant fréquemment les substances anti-leucocytaires dans les sérums de malades ayant reçu de multiples transfusions.

Néanmoins les techniques utilisées dans ces recherches préliminaires étaient imparfaites et ne permettaient pas toujours la répétition exacte des résultats car elle n'éliminaient pas avec certitude les fausses réactions positives.

La nouvelle technique nous avons développée est une modification de la technique d'agglutination par agitation

circulaire décrite par DAUSSET et MALINVAUD (132). L'élimination de la cause d'erreur principale, due à la thrombo-agrégation, est obtenue par le chauffage qui probablement détruit certains facteurs de la coagulation présents dans l'atmosphère plaquettaire DAUSSET et COLIN (133).

La détection régulière des thrombo-agglutinines immunes peut avoir d'importantes conséquences sur le plan pratique. La connaissance des groupes plaquettaires n'est pas négligeable en pratique transfusionnelle et en pathologie.

Ils peuvent influencer la survie des plaquettes transfusées chez un receveur sensibilisé. Il est probable, quoique nous n'ayons pas encore étudié ce point que les plaquettes compatibles survivent normalement dans l'organisme du receveur (3 à 5 jours) alors que les plaquettes incompatibles sont immédiatement éliminées. On sait que l'effet hémostatique des transfusions chez les thrombopéniques s'anéantit au fur et à mesure qu'elles sont répétées. Ceci est dû sans doute à ~~xxxxxxxxxxxx~~ l'apparition des iso-anticorps immuns antiplaquet-
taires.

Ils peuvent être responsables de certains chocs transfusionnels. Le conflit antigène-anti-corps provoqué l'apparition de frisson. D'après BRITTINGHAM (cité par HARRINGTON) (134) les plaquettes isolées provoqueraient des chocs transfusionnels moins fréquemment et de moindre intensité que l'injection du "buffy coat". Ce qui est une bonne corrélation avec nos résultats : Sensibilisation plus tardive et moins intense contre les plaquettes que contre les leucocytes.

En fin la connaissance des groupes plaquettaires permettra d'expliquer le mécanisme de certains purpura thrombopéniques du nouveau-né dont un certain nombre ont déjà été signalés dans la littérature sans qu'une étude sérologique satisfaisante, par manque de techniques adéquates ait été faite.

VIIIème CHAPITRE

VIIIème CHAPITRE .

C O N C L U S I O N

R E S U M E

1°- Il est décrit une technique de recherche des substances sériques, capable de provoquer à 37° C l'agglutination plaquettaire. Il s'agit d'une modification de la technique d'agglutination par agitation circulaire de DAUSSET et MALINVAUD¹⁴⁰. La modification essentielle consiste à chauffer à 56° C la suspension de plaquettes lavées. Il est supposé que ce chauffage agit par destruction des facteurs de la coagulation, présents dans l'atmosphère plaquettaire.

2°- Des thrombo-agglutinines actives à 37° C ont été rencontrées dans 87 sérums provenant de l'étude de 1633 sérums pathologiques. Le rôle des transfusions est prouvé par le fait que la fréquence relative croît avec le nombre des transfusions, passant de 3,63 % chez les malades ayant reçu de 1 à 3 transfusions, à 47,36 % chez ceux qui ont reçu de 101 à 200 transfusions. Deux malades ont développé des thrombo-agglutinines au cours d'un chorio-épithélioma. De même le rôle des grossesses est probable puisqu'on note une nette prédominance féminine (70,11 %) chez les porteurs de thrombo-agglutinines.

3°- Les caractères sérologiques de ces thrombo-agglutinines sont les suivants :

- Elles ont un optimum d'action à 37° C, sont actives au voisinage de pH et de l'ionisation physiologique.
- Elles sont inhibées par un facteur sérique thermolabile qui est probablement le complément (système inhibiteur identique à celui des leuco-agglutinines).
- Elles sont présentes dans les gamma-globulines.

- Elles peuvent également provoquer la lyse, la fixation du complément.
- Elles peuvent être décelées encore par réaction de consommation de l'antiglobuline, par le test mixte d'agglutination, par l'antiglobuline ou par la thrombo-élastographie.
- Elles n'agissent pas sur les propres plaquettes du donneur et agissent sur certaines variétés de plaquettes.
- Elles sont sans rapport avec les substances anti-érythrocytaires,
 - avec les substances anti-plaquettaires,
 - avec les thrombo-agglutinines froides,
 décelées dans les sérums de purpura thrombopénique non transfusés et sans antécédents de grossesse.
- Leurs rapports avec les leuco-agglutinines sont étroits : ils apparaissent le plus souvent chez les mêmes malades.
- Leur identité est probable dans de nombreux cas.


4°- Ce sont, vraisemblablement, des iso-anticorps immuns d'origine transfusionnelle (ou, éventuellement, d'origine gravidique).

- Elles permettront de définir des groupes plaquettaires qui sont indépendants des groupes érythrocytaires.
- Elles sont responsables de certains chocs transfusionnels et, sans doute, de certains purpuras thrombopéniques du nouveau-né.

IX ème CHAPITRE


LES FIGURES.

Figure No. 1.




. AGITATOR.

Figure No. 2.




ANTIGEN-AGGLUTINATION POSITIVE.

Figure No. 3.



THROMBO-AGGLUTINATION

(NEGATIVE.)



THROMBO-ELASTOGRAMME.

En haut = Melange sérum normal + plasma riche en plaquettes normales.

En bas = Melange sérum pathologique (contenant une thrombo-
-agglutinine de titre élevé 1/512)
+ plasma riche en plaquettes normales.

FIG.5

Léger No

15,41

4-2-7-2-2-2-2

absorbé sur un pool de leucocytes de plaquettes normaux et testé contre des leucocytes et des plaquettes normaux provenant d'un même individu.

AVANT ABSORPTION

Testé contre

Leucocytes
+++ 1/256

plaquettes
++ 1/32

ABSORBE SUR LEUCOCYTES

ABSORBE SUR PLAQUETTES

Testé

contre

Leucocytes
+ 1/2

plaquettes
+ 1/4

ELUTION

+1/8

+ 1/2

Testé

contre

leucocytes
-

plaquettes
-

ELUTION

+1/4


+1/4

FIGURE NO. 6

p. 41

SERUM Dr.

absorbé sur un pool de leucocytes et de plaquettes normaux
et testé contre des leucocytes et des plaquettes normaux
d'un même individu.



Al. no. 7

SERUM

SERUM Du.

p. 42

absorbé sur un pool de leucocytes^{et} de plaquettes normaux et testé contre des leucocytes et des plaquettes normaux provenant d'un même individu.

AVANT ABSORPTION

Testé contre

Leucocytes
++ I/I6

Plaquettes
++ I/I6

ABSORBE sur LEUCOCYTES

ABSORBE SUR PLAQUETTES

Testé contre

Testé contre

Leucocytes
+ I/2

Plaquettes
+ I/2

Leucocytes

Plaquettes

ELUTION

ELUTION

+ I/2

+ I/I

+ I/2


+ I/2

Figure No.8.

b.42

SERUM Cr (Anti-MAC)

absorbé sur des leucocytes et des plaquettes d'un malade atteint de leucémie myéloïde chronique et testé contre les mêmes leucocytes et les plaquettes.



Existence d'un anticorps anti-plaquettaire.

X ème CHAPITRE

DES TABLEAUX.

Tableau No.1. p;28.

Différence entre THROMBO-AGREGATION et THROMBO-AGGLUTINATION.

THROMBO-AGREGATION.

NON-IMMUNOLOGIQUE

première stade de
métamorphose
visqueuse à
cause de thrombine
et les autres
facteurs
dialysables.

INHIBITION PAR SO_4Ba

THROMBOAGGLUTINATION.

IMMUNOLOGIQUE.

Réaction antigène-anticorps
à cause de:
A. Iso-anticorps
B. Auto-anticorps?

Pas d'inhibition par SO_4Ba

TABEAU No. 2.n p; 31.

INFLUENCE DU NOMBRE DES LAVAGES DES PLAQUETTES DANS LA REACTION
DE THROMBO-AGGLUTINATION A 37°C.

<u>DILUTIONS DU SERUM THROMBOAGGLUTINANTS.</u>											
No; Lavages	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256	1/512	1/1024	
0 lavages	+++	++	+	+	-	-	-	-	-	-	
2 "	+++	++	++	++	+	-	-	-	-	-	
4 "	++	++	+++	+	+	-	-	-	-	-	
6 "	+++	++	++	+	-	-	-	-	-	-	
8 "	+++	++	++	++	+	-	-	-	-	-	
10 "	+++	++	++	+	-	-	-	-	-	-	
12 "	+++	++	++	++	-	-	-	-	-	-	

La lecture était d'autant plus aisée que les plaquettes étaient d'avantages lavées : agglutinants mieux formés est plus compacts.

TABLEAU 2.4.

INFLUENCE DU TEMPS DE CHAUFFAGE A 56° C
DE LA SUSPENSION PLAQUETTAIRE SUR L'AGGLUTINATION




Tableau No.5.

P. 34.

INFLUENCE DE VITESSE D'AGITATION SUR LA REACTION DE
THROMBO-AGGLUTINATION à 57°C
(Temps constant 30 minutes).

Rotations par Mins.	Dilutions de sérum thrombo-agglutinant.										
		1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256	1/512	1/1024
1° sérum	80	++	++	++	++	+	(+)	-	-	-	-
	110	++++	++++	++++	++	+	++	+	+	-	-
2° sérum	80	++	++	++	++	+	+	(+)	+	-	-
	110	++++	++++	++++	++	+	+	+	+	+	-

Tableau no: 6.

INFLUENCE DU NOMBRE DES PLAQUETTES DANS LA REACTION DE
THROMBO-AGGLUTINATION

[illegible]

INFLUENCE DE CHAUFFAGE SUR LES THROMBO-AGGLUTININES (CHAUDES).

[illegible]

Tableau no; 8. P;35.

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA REACTION D'AGGLUTINATION
PAR LES THROMBO-AGGLUTININES CHAUDES.

Temperature de la réaction.	Sérum normal	Sérum thromboagglutinants.	
		No.1	No;2.
4°C	-	+1/4	+1/4
18°C	-	+1/16	+1/16
37°C	-	+1/64	++1/512

p. 35

p. 35

[illegible]

INFLUENCE DE L'IONISATION * SUR LA REACTION DE
THROMBO-AGGLUTINATION A 37°C

Concentration en NaCl pr; 1000	Dilutions du sérum thromboagglutinants.									
	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/132	1/256	1/512	1/1024
16										
15										
14										
13										
12										
11	++	+++	+++	+++	+	-	-	-	-	-
10	++	+++	+++	+++	+	-	-	-	-	-
9	++	+++	+++	+++	+	-	-	-	-	-
8	++	+++	+++	+++	+++	++	+	(+)	+	-
7	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	-
6	+++	+++	+++	+++	+++	++	+	(+)	-	-
5	+++	+++	+++	+++	++	+	-	-	-	-
4										
3										
2										
1										
0										

FAUSSEMENT POSITIF

FAUSSEMENT POSITIF

*L'hypertonie a été obtenue en ajoutant aux sérums normaux et pathologiques du NaCl en quantité croissante. Les sérums étaient ensuite dilués dans un milieu salin tamponné ayant la même hypertonie.

L'hypotonie du sérum n'a pas été réalisée. Mais ceux-ci ont été dilués en milieu salin hypotonique.

235.

Tableau no.II.

INFLUENCE DU MILIEU DE DILUTION SUR LA THROMBO-AGGLUTINATION A 37°C.

Milieu de dilution	Dilution du sérum thrombo-agglutinant:								
	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256	1/512
milieu salin tamponné à pH 7,2	++++	++++	++++	++++	+++	++	+	±	-
en sérum inactivé	+++	+++	+++	+++ +++	+++	++	+	(+)	-
en sérum inactivé + milieu	++++	++++	+++	+++	++	(+)	-	-	-

12

TEMPERATURE

Tableau no. I2 (suite)

Sérum inacti- -vé.	en sérum normal inactivé	tampon PH 7,2	I/1	I/2	I/4	I/3	I/16	I/32	I/64	I/128	I/256	I/512	I/1024
			+++	+++	+++	++	++	++	++	+	(-)	-	-
		sérum normal frais	++	++	++	+	+	-	-	-	-	-	-
		sérum normal inactivé	++++	++	++	+++	+	++	+	+	-	-	-

Tableau no.13

P36

ROLE DU COMPLEMENT DANS LA REACTION DE THROMBO-AGGLUTINATION.

	Dilution du sérum thrombo-agglutinant en sérum normal, inactivé, absorbé sur plaquettes normales.							
	I/I	I/2	I/4	I/8	I/16	I/32	I/64	I/128
<u>Sans complément</u>	+++	++++	++++	++	-	-	-	-
<u>Avec du complément</u> I/8 de sérum frais dans la réaction finale	+++	++++	++++	++	+	-	-	-
I/15 de sérum frais dans la réaction finale	+++	+++	++++	++	+	-	-	-
I/12 de sérum frais dans la réaction finale	+	++	++	+	-	-	-	-
I/9 de sérum frais dans la réaction finale	-	+	++	(+)	-	-	-	-
I/6 de sérum frais dans la réaction finale	-	+	+	+	-	-	-	-
I/3 de sérum frais dans la réaction finale	-	-	+	-	-	-	-	-
I/2 de sérum frais dans la réaction finale	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau no. 14.

REACTIONNEMENT DES SERUMS POSSEDANT DES THROMBO-AGGLUTININES
COMPLETES-CHAUDES . .

	Sérum Normal	Sérum Pathologiques No.1	No.2.
AVANT FRACTIONNEMENT	- -	+++	+++
APRES FRACTIONNEMENT			
GAMMA GLOBULIN	-	+++	+++
1 + 2 +			
Globulines	-	-	-
ALBUMINES	-	-	-

Tableau No.15. p;37.

COMPARAISON DE LA THROMBO-AGGLUTINATION ET LA FIXATION DU
COMPLEMENT *
(H.SELIGMANN).

No.des Sérums	Thromboagglutination à 37°C Intensité en titre moyen	Fixation du Complement.
1	+64	pouvoir anti-C'
2	++128	+
3	+16	±
4	++32	+
5	+++128	+
6	+++256	+32
7	++64	+
Temoins	-	-

* Trois sérums possédant des thrombo-agglutinines froides ont également été testés. La fixation du complément est resté négative.

Tableau No.16.

133.

COMPARISON ENTRE LA THROMBO-AGGLUTINATION ET LA CONSOMMATION INDIRECTE DE L'ANTIGLOBULINE.

No. des Sérums	Thrombo-agglutination intensité et titre moyen	Consommation de l'antiglobuline chute du titre (nombre de dilutions géométriques).
1	++ 1/32	+ 5
2	++ 1/32	+ 4
3	++ 1/32	+ 3
4	++ 1/32	+ 4
5	+++ 1/64	+ 6
6	+++ 1/64	+ 5
7	++ 1/32	+ 6
8	++ 1/8	+ 4
99	+++ 1/64	+ 4 $\frac{1}{2}$ (titre 1/16)
10	++ 1/16	+ 3 $\frac{1}{2}$
11	++ 1/16	+ 6

Comparaison du titre d'un sérum par les techniques.

	1/1	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128
Agglutination	++++	++++	++++	+++	+++	++	+	-
Consommation de l'antiglobuline	4 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-	-

11. 11. 71

LEUCOCYTES ET PLAQUETTES - 1951

SÉRUMS LEUCO ET THROMBO - AGGLUTINANTS

	Cr		Bot		Au		Cp		Lo		Ch		Du		Dr		Ver		Mo		Po		Lie		Tg		Th		Su		
	leuco	plaq	leuco	plaq	leuco	plaq	leuco	plaq	leuco	plaq	leuco	plaq	leuco	plaq	leuco	plaq	leuco	plaq	leuco	plaq	leuco	plaq	leuco	plaq	leuco	plaq	leuco	plaq	leuco	plaq	
3	—	—	8	32	32	64	128	8	256	64	—	32	64	128	128	8	16	16	512	512	128	32	16	16	8	—	8	16	—	8	
4	32	8	4	8	64	32	128	16	256	128	32	8	512	128	128	32	128	8	512	128	32	32	16	16	8	32	16	16	—	—	
7	—	—	64	64	32	32	256	128	256	32	8	32	512	128	128	64	64	16	512	512	32	32	16	16	32	128	16	32	128	8	
9	—	—	64	8	64	32	512	16	512	64	64	32	512	128	128	32	128	16	512	256	512	16	32	8	64	32	16	32	512	128	
11	16	16	—	4	16	32	64	8	512	16	16	64	—	64	128	16	8	8	512	256	1	—	—	—	54	32	64	8	16	—	16
20	—	—	32	8	8	16	32	16	32	16	16	64	512	64	1	8	64	16	512	64	64	32	8	16	16	8	8	8	16	—	
23	32	32	1	32	16	32	1	16	16	8	8	32	256	128	128	64	8	8	256	512	1	16	5	1	32	16	—	—	32	32	
26	—	64	64	32	16	16	128	16	256	16	7	32	512	64	256	64	64	16	512	512	64	64	64	—	32	32	1	8	32	64	
28	—	8	32	32	2	8	16	4	256	8	16	16	16	16	8	1	4	1	512	64	32	16	16	—	8	32	16	4	—	—	
31	32	32	16	16	32	16	64	8	256	64	32	64	16	64	256	128	—	16	16	512	128	256	64	—	2	64	—	—	—	—	
32	32	16	16	4	16	32	16	64	256	32	—	16	512	128	256	8	—	16	1	32	1	1	8	16	64	32	4	16	—	—	
35	64	8	8	16	16	16	16	—	256	8	32	64	128	16	128	16	—	16	1	32	1	1	8	16	64	32	4	16	—	—	
39	—	—	128	8	1	16	32	32	256	64	16	128	16	16	8	1	4	8	512	128	256	16	32	—	16	16	16	16	4	16	

LEUCOCYTES ET PLAQUETTES NON AGGL.

SERUM Mo

	Absorption sur leucocytes testé contre		Absorption sur plaquettes testé contre	
	<u>Leucocytes</u>	<u>Plaquettes</u>	<u>Leucocytes</u>	<u>Plaquettes</u>
avant absorption	+++ I/5I2	++++ I/I6	+ I/5I2	++++ I/I6
après la 1 ^{ère} absorption	+ I/64	+ I/4	++ I/32	+ I/4
au de lavage	±	±	-	-
luat	+ I/8	+ I/4	+ I/I6	+ I/4
après la 2 ^{ème} absorption	+ I/64	+ I/2	+ I/I6	-
au de lavage	±	-	-	-
luat	+ I/4	+ I/I	+ I/I6	+ I/2
après la 3 ^{ème} absorption	+ I/I6	+ I/I	+ I/I6	-
au de lavage	-	-	-	-
luat	+ I/4	-	-	-
après la 4 ^{ème} absorption	+ I/8	-	+ I/4	-
au de lavage	-	-	-	-
luat	+ I/2	-	-	-
après la 5 ^{ème} absorption	-	-	±	-
au de lavage	-	-	-	-
luat	-	-	-	-

Sérum Dr

	Absorption sur leucocytes testé contre		absorption sur plaquette testé contre	
	Leucocytes	Plaquettes	Leucocytes	Plaquettes
Après la 1ère absorption	+ I/I6	++ I/I6	+ I/I6	+ I/8
Eau de lavage	-	-	-	-
Eluat	-	+ I/2	-	+ I/4
Après la 2ème Absorption	-	-	-	-
Eau de lavage	-	-	-	-
Eluat	-	-	-	-
Après la 3ème absorption	-	-	-	-
Eau de lavage	-	-	-	-
Eluat	-	-	-	-
Après la 4ème absorption	-	-	-	-
Eau de lavage	-	-	-	-
Eluat	-	-	-	-
Après la 5ème absorption	-	-	-	-
Eau de lavage	-	-	-	-
Eluat	-	-	-	-

Tableau no. 20.

RAPPORT ENTRE LES LEUCO-AGGLUTININES , LES LEUCO + THROMBO-AGGLUTININES
ET LE NOMBRE DES TRANSFUSIONS.

entre le 24 Octobre 1957 et le 6 Mars 1959

Nombre de transfusions	Nombre de malades	Leuco-agglutinines		Leuco + Thrombo-agglutinines	
		Nombre	%	Nombre	%
Inconnu	736	12	1,63	6	0,81
0	256	4	1,56	2	0,78
I à 3	165	12	7,27	6	3,63
4 à 10	175	25	15,75	14	8,79
11 à 20	98	18		10	
21 à 30	28	6	40,35	5	33,33
31 à 40	16	7		6	
41 à 50	13	10		8	
51 à 60	11	3		2	
61 à 70	6	3	50,0	2	42,85
71 à 80	6	5		5	
81 à 90	1	1		1	
91 à 100	4	2		2	
101 à 150	12	6	57,89	5	47,36
151 à 200	7	5		4	
200	5	3	66,0	1	20
nombre exact	64	2	14,89		
+++Inconnu)	30	12		8	8,51
Total général	1633	136	% 8,32	87	% 5,32
Total des malades transfusés	641	120	% 18,72	79	% 12,32

RAPPORTS ENTRE LES SUBSTANCES DÉCELEES SEULEMENT PAR LA
CONSUMMATION INDIRECTE DE L'ANTIGLOBULINE SUR PLAQUETTES ET
LEUCOCYTES NORMAUX.

Nom.	DIAGNOSTIC	Nombre de transfusions.	Consommation de l'antiglobuline sur plaquettes chute du titre : nombre dilution géométrique.	Thrombo-agglutination à 37°C
C.	Purpura thrombopénique Chr.	1	6	-
Gu	do	6	4	-
Lu	do	Nombreuses	4	-
P.	do	2	4	-
Tr	do	1	4	-
Sl	do	0	9	-
Ch	do	3	3	-
Gr	do	1	3 $\frac{1}{2}$	-
An	do	1	5	-
B.	do	20	4	-
De	do	3	4	-
Du	do	2	5	-
Ma	do	0	4	-
Mal	do	2	5	-
Ta	do	?	6	-
Tam	do	1	7	-
Va	do	13	5	-
Cho	do	0	3	-
Th	do	7	3	-
R.	do	0	4 en crise 0 après guér.	-
De	Purpura thromb. durée ind.	4	9	-
Vi	do	?	6	-

5.19.

Tableau n. 22.

PRESENCE DES ANTIGENES A ET B SUR LES PLAQUETTES LAVEES.

	Anti-A			Anti-B			Anti-A + B		
	Pl A	Pl B	Pl O	Pl A	Pl B	Pl O	Pl AA	Pl B	Pl O
1 lavage ++	-	-	-	++	-	++	++	-	
3 lavages ++	-	-	-	++	-	++	++	-	
5 do ++	-	-	-	++	-	++	++	-	
8 do ++	-	-	-	++	-	++	++	-	

Tableau No.23

b.19

THROMBO-AGGLUTININES FROIDES DECELEES CHEZ 3731 MALADES
EXAMINES.

	Nombre de cas examinés	Nombre de cas Positifs	% de Positifs
Cirrhose du foie ou splénomégalie le plus souvent avec thrombo- pénie modérée	131	46	35,1
Purpura thrombopénique Idiop. chroniques	66 18	9 5	13,6 31,1
Aigus d'évolution inconnue	18 95	5 22	31,1 22,1
Purpura thrombopéniques Symp. d'une hémopathie maligne d'un lupus érythémateux	677 12	19 5	2,8 41,6
Pancytopénies ou leucopénies diverses	327	17	5,1
Syndrômes hémorragiques non thrombo-péniques ou de nature inconnu avec anticogulant circulant	2 12 4	9 4	12,5 100
Anémies hémolytiques acquis. Congen.	186 95	9 6	5,3 6,3
Malades ayant reçu du sérum anti-tétanique	64	10	6,4
Maladies diverses ou inconnues	1984	19	0,95
Total	3731	180	

RAPPORT DES THROMBO-AGGLUTININES FROIDES ET DES ANTICOAGULANTS
CIRCULANTS

ANTI-THROMBOPLASTINES CIRCULANTES

		<u>thrombo-agglutinine</u> <u>froide</u>
Cas	1.....	++ 1/4
CAS	2.....	++ 1/4
Cas	3.....	++ 1/4
Cas	4.....	++ 1/8

ANTI-THROMBINE

Cas 5.....

Tableau No.25.

p.21.

COMPARAISON DES DIFFERENTS " ANTICORPS ANTI-PLAQUETTAIRES"

	Thronbo- agglutinine froides	Thronbo- agglutinine chaudes	Thronbo-anticorps Incompl. (*)
Thernostabilité	+	+	+
Détruit par;	10' à 62°C	5' à 70°C	
Conservé à -20°C	+	+	+
Non-absorbable par $SO_4^{4-}Ba$ ou (PO_4) ^{2-}Ca	+	+	+
Ganna-Globulines	+	+	+
Optimum	T° 4°C pH 7,1 à 9,2	37°C 6 à 9	37°C 6, & 8
Ion- isatilon	jusqu'à 12 gr 0/00	jusqu'à 12 gr 0/00	?
Spécificité	Pan agglu- -tinine	Pan	Pan
Nature	Inconnu	ou iso- agglutinine Iso } anticorps auto } innuns	ou iso- agglu- -tinine Iso } anti- auto } corps innuns

* par consommation d'antiglobuline.

XI ène CHAPITRE.

B I B L I O G R A P H I E.

B I B L I O G R A P H I E

OUVRAGES GENERAUX

1. BERNARD J. et
BESSIS M. Hématologie Clinique.
Masson & Co. Editeurs, Paris, 1958.
2. BIZET P. Les Thrombo-agglutinines immunes.
Thèse, Université de Paris. 1958.
3. BOORMAN K.E. et
DOOD B.E. Blood Group Serology.
J. & A. Churchill Ltd., Publishers, London, 1957.
4. DAUSSET J. Immuno-hématologie, Biologique et Clinique.
Editions Médicales Flammarion. Paris. 1956.
5. DUNNSFORD I. et
BOWELY C.C. Technics in Blood Grouping.
Oliver & Boyd, Publishers, London, 1955.
6. DUJARIC DE LA RIVIERE, R. Les groupes sanguins chez les animaux,
et EYQUEM A. collection de l'Institut Pasteur.
Editions Médicales Flammarion, Paris, 1953.
7. LUNDEVALL J. Serological Studies of Human Blood Platelets.
Supplement to Volume 10, 1958, of the Scandinavian
Journal of Clinical and Laboratory Investigation,
E. SEM A.s, Publishers, Halden, 1958.
8. LANDSTEINER K. The Specificity of the Serological Reactions.
Harvard University, Publish. Cambridge (Mass.)
U.S.A. 1946.
9. LE ROUX M. La Thrombélastographie (Thrombodynamographie),
M. Garcia, Editeur, Asnières (Seine), 1957.
10. MAUPIN B. Les Plaquettes Sanguines de l'Homme.
Masson & Co Editeurs, Paris, 1954.
11. MOLLISON P. Blood Transfusion. In Clinical Medicine, 2nd Edition.
Blackwell, Publishers, Oxford, 1956.
12. MOULLEC J. Techniques de détermination des Groupes Sanguins
Appliqués à la Transfusion. Masson & Co., Editeurs,
Paris, 1949.
13. PROST J. Thèse, Université de Lyon, 1959.
L'Amplitude Maxima du Thrombodynamogramme.

14. SEVAG M.G. Immuno-Catalysis and Related Fields of Bacteriology and Biochemistry.
C.C. Thomas, Publishers, Springfield, Illinois, U.S.A.
1951.
15. VERMA P. Thèse, Université de Paris, 1958. Contribution à l'étude des Réactions antigènes-anticorps in vivo.
16. WEINER A.S. Blood Groups & Transfusion, 3rd Edition.
C.C. Thomas, Publishers, Springfield, Illinois, U.S.A.
1946.
17. Symposium on Drug Sensivity, Blackwell, Publishers, London, 1958.
18. Rapports du IIIème Congrès International d'Allergologie. Editions Médicales, Flammarion, Paris, 1958.
19. Proceedings of the 6th Congress of the International Society of Blood Transfusion, Boston, Sept. 1956, Karger, Basel, 1958.
20. Proceedings of the 7th Congress of the International Society of Blood Transfusion, Sept. 1958, Palazzo dei Congressi, Rome, 1958.
21. Rapports et communications du 2ème Congrès National de Transfusion Sanguine, Bordeaux, 1956, Delmas, Bordeaux, 1958.
22. Comptes-Rendus du 6ème Congrès de la Société Européenne d'Hématologie, Copenhagen, 1957, Abstracts. Langkaers Bogtrykkeri, Copenhagen.

Chapitre I. INTRODUCTION

1. EVANS R.S.,
TAKAHASHI K.,
DUANE R.T.,
PAYNE R.
LIU C.K. Primary thrombocytopenic purpura and acquired hemolytic anemia. Evidence for a common etiology.
ARCH. INT. MED., 87, 48-65, 1951.
 2. MIESCHER P.,
REYMOND A.,
VANNOTTI A. Thrombopénies thromboélastiques,
Exper. Med. & Surgery, 12, 501-534, 1954.
 3. STEFANINI M., and
DAMEHESK W. Idiopathic Thrombocytopenic Purpura,
A Challenge. Lancet, 265, 209-212, 1953.
 4. DAUSSET J. Immunohématologie des Plaquettes,
Presse Méd., 61, 1533-1535, 1953.
- ## Chapitre II. HISTORIQUE Etat actuel de l'immuno- hématologie des plaquettes.
5. MARINO M.F. Recherches sur les plaquettes du sang,
C.R. Soc. Biol., 57, 194-197, 1905.
 6. LESOUP L.,
PAGNIEZ Ph. Un procédé d'isolement à l'état de pureté des hémato-
blastes du sang,
C.R. Acad. Sc., 142, 1562, 1906.
 7. CHEVREL et
ROGER Isolement des hémato blastes. Production d'un sérum
anti-hématoblastique.
C.R. Soc. Biol., 63, 501-502, 1907.
 8. COLE R.I. Note on the production of an agglutinating serum for
Blood platelets.
Bull. John Hopkins Hosp., 18, 261-262, 1907.
 9. LEDINGHAM J.C.G. The Experimental production of purpura in animals by
the introduction of anti-Blood platelets sera.
A preliminary communication.
Lancet, 186, 1673-1676, 1914.
 10. LEDINGHAM J.C.G.
and BEDSON S.P. Experimental Purpura (Communication),
Lancet, 188, 311-316, 1915.
 11. TOCANTINS L.M. Experimental Thrombopenic Purpura in Dog.
Arch. Path., 21, 69-78, 1936.
 12. ACHARD Ch.
AYNAUD M. Les globulines dans l'anaphylaxie,
C.R. Soc. Biol., 67, 83-84, 1915.

13. STEFANINI M. Studies on platelets VI, Demonstration and
characterisation of a heterologous (FORSSMAN)
platelet agglutination.
Blood, 7, 700-709, 1952.

14. FILO E. Anémies et thrombopénies thrombolytiques expérimen-
tales. Le Sang, 10, 7046726, 1936.

15. MIESCHER P., Nouvelles acquisitions concernant la pathogenèse
CRUCHAUD S., de la thrombopénie essentielle.
HEMMLER G. Helv. Med. Acta, 19, 434-441, 1952.

16. JAMRA M. Etude sur les thrombo-lysines.
de ANGELS C., Le Sang, 24, 669-705, 1953.
VERRASTRO T.,
COEHLO E.

17. STEFANINI M., Studies on platelets IX,
DAVEHESK W., Blood, 8, 26-65, 1953.
CHATTERJEA J.B.,
ADELSON Ed.,
MEDINCOFF, I.B.

18. SAINT-PAUL M., Intérêt d'une réaction anaphlaxis locale du type
MILLOT P. Prausnitz-Kustner sur lapin, et le cobaye. Application
à l'étude d'immun-anticorps anti-thrombocytaire du
lapin. C.R. Ac. Sc., 242, 1543-1547, 1956.

19. MILLOT P. La réaction de P.K. en immunologie expérimentale.
VERMA P. Application à l'étude d'immunanticorps anti-thrombo-
SAINT-PAUL M. cytaire etc.. Ann. Inst. Pasteur, 94, 5, 598-614, 1958.

20. EVANS R.S. Arch. Int. Med., 87, 48-65, 1951.

21. EVANS et Coll. Arch. Int. Med., 87, 48-65, 1951.

22. HARRINGTON W.J., Démonstration of a thrombocytopenic factor in the
MINNICH V., Blood of a patient with Thrombocytopenic Purpura.
HOLLINGSWORTH J.W., J. Lab. & Clin. Med., 38, 1-10, 1951.
MORE C.V.

23. STEFANINI M. Immunological aspect of Idiopathic Thrombocytopenic
CHATTERJEA J.B. Purpura.
J. Clin. Invest., 31, 452-464, 1952.

24. HIRSCH E.O., The transfusion of human platelets.
GARNER F.H. J. Lab. & Clin. Med., 39, 556-569, 1952.
25. DAUSSET J., Agglutination et destruction in vitro des
DELAFontaine P., plaquettes normales par le sérum d'une malade
FLEURIOT Y. atteinte de purpura aigu. Inhibition par ce
sérum de la rétraction du caillot.
Le Sang, 23, 373-384, 1952.
26. STEFANINI M., Studies on platelets IX,
DAMEHESK W., Blood, 8, 26-65, 1953.
et Coll. Voir également n° 17.
27. STEFANINI M., Studies on platelets. II. : The effect of
CHATTERJEA J.B., platelet-rich polycythemic blood on the
DAMEHESK W., platelets and hemostatic function in
ZANNOS L., and "idiopathic" and secondary thrombocytopenic
SANTIAGO E.P. purpura. Blood, 7, 53-76, 1952.
28. DAUSSET J., Normal and pathological platelets agglutinins
MALINVAUD G. investigated by means of the shaking method.
(Confirmation of the presence of A and B
antigens in platelets).
Vox Sanguinis, 4, 204-213, 1954.
29. HARRINGTON W.J., Platelets Transfusion.
SPRAGUE Ch. C., J.A.M.A., 150, 1193-1198, 1952.
LANGE R.D.,
SHAPLEIGH J.B.

Chapitre III:

LES DIVERS ANTIGENES PLAQUETTAIRES.

I - Les antigènes du système ABO.

30. SCHAEFER K., Die Blutgruppenspezifität Der Thrombozyten.
GENNERICH H. Kl. Wschschr., 14, 491-492, 8 April 1939.
31. MOREAU P., Mise en évidence des antigènes de types A
ANDRE A. et B dans les plaquettes.
C.R. Soc. Biol., 148, 174-176, 1954.
32. MOREAU P., Présence des antigènes A et B dans les
ANDRE A. plaquettes.
Vox Sanguinis, 4, 46-51, 1954.

33. NOUREAU P. Blood groups of human platelets.
Nature, 174, 88, 1954.
34. GUREVITCH J. Letter from Israel. Group in the Blood
NELKEN D. platelets.
J.A.M.A., 155, 9, 857, 1954.
35. Do ABO Groups in the Blood Platelets.
J.Lab.Clin.Med., 44, 4, 562-570
36. Do ABO Groups in the Blood Platelets
Le Sang, 26, 1, 113-115, 1955
and Nature 173, 356, 1954
37. Do Studies on platelets antigens II.A2 & A_I
Subgroups in Blood platelets.
J.Lab.Clin.Med., 4, 4, 530-533.
38. EYQUEM A,
PODLIACHOUK L,
MAUPIN B. Les antigènes hétérophiles J, R. et A des
plaquettes et leucocytes humains.
Ann. Inst. Pasteur., 91, 598-602.
39. HERVIER P. Mise en évidence des antigènes A et B dans
MAUPIN B. les leucocytes et plaquettes hum
BERROCHE L. par des épreuves d'absorption et d'élution.
DAUSSET J. Vox Sanguinis, 5, 82-93, 1955
40. SCHAFER K.
GENNERICH H. Die Blutgruppenspezifität der Thrombozyten.
Kl. Wsch., 14, 491-502, April, 1939.
41. BROUSSY J.
DUCOS J. Mise en évidence des antigènes A & H dans
RUFFIE J. les plaquettes sanguines humaines par une
méthode d'absorption.
C.R.Soc.Biol. (à paraître).
42. RUGGIERI P. Gli antigeni ABO delle piastrine.
BOLOENESI G.. (Les antigènes ABO Dans les plaquettes)
Boll.Soc; Ital. Ematol., 2, 92-95, 1955.
43. DAUSSET J. Confirmation of the presence of A and B
MALINVAUD G. antigens in platelets.
Vox Sanguinis, 4, 204-213, 1954.
44. COOMBS R.R.A..
BEDFORD D. The A and B antigens on human platelets
ASHWURST D.R. demonstrated by means of mixed erythrocyte
platelets agglutination.
Vox Sanguinis, 5, 11-115, 1955.

2) Les antigènes du système Rhesus.

45. DARRIGOL J. Problème immuno-hématologiques posés par les
thrombocytes.
Thèse Université de Bordeaux, Delmas,
1954.

46. RUGGIERI P. La iso-antigenicite delle piastrine umane e l'antigene Rh.
Boll. Ist. Sieroter. Milan, 35, 196-201, 1956.
47. DAUSSET J.
COLOMBANI J.
EVELIN J. Présence de l'antigène Rh(D) dans les leucocytes et les plaquettes humaines.
Vox Sanguinis, 3, 266-276, 1958.
48. MOULINIER J.
SERVANTIE J. Technique de la réaction de consoulation d'antiglobuline.
Rev. Franç. et lin. Biol., 1, 355-364, 1958.
49. DUCOS J.
BROUSSY J.
RUFFIE J. Mise en évidence des antigènes D, C, c, C^w, sur les plaquettes sanguines humaines.
C.R. Soc. Biol., 1, 847, 1958.
50. MEYER W.
WUILLÉRET B.
HASSIG A. Über den nachweis von Blutgruppenantigenen Thrombozyten.
Z. Immunoforsch. 112, 369-372, 1955.
51. KARAVITCH J.
NELKEN D. Studies on platelets antigens III Rh-Hr antigens in platelets.
Vox Sanguinis, (New Series) 2, 342-347, 1957.
52. ASHHURST D.E.
BEDFORD D.
COOMBS R.R.A. Examination of human platelets for ABO, MN, Rh, Tj^a, Lu, Lewis system antigens by means of mixed erythrocyte-platelet agglutination.
Vox Sanguinis, 1(N.S.), 235-240, 1956.

3) Les autres antigènes de groupe erythrocytaire.

53. Do Do
54. BROUSSY J.
DUCOS J.
RUFFIE J. Mise en évidence des antigènes M&N dans les plaquettes Sanguine humaines.
Rev. Hematol. (à paraître).
55. Do Mise en évidence de l'antigène P dans les plaquettes sanguines humaines.
Sangre (à paraître).
56. Do
et Mlle. MARTY. Mise en évidence de l'antigène Kell dans les plaquettes humaines.
Rev. Fr. et Clin. Biol. (à paraître).

4) Les antigènes proprement plaquettaires.

57. HIRSCH E.O.
GARDNER C.H. The life span of blood platelets.
J. Clin. Invest. 30, 649, 1951.
58. STEFANINI H.
PLITMAN G. Antigenicity of platelets and evidence for platelets groups in humans.
J. Clin. Invest., 32, 606, 1953.

59. H. RINGTON W. J. Demonstration of a thrombocytopenic facteur
SPRAGUE Ch.C. in the Blood of patients with Thrombocyto-
MINNICH V. penic purpura.
MOORE C. V.. J.Clin.Med. 8, I-10, 1951.
AULVIN R.C.
BUBACH R.
60. STEFANINI M.. Antigenicity of platelets and evidence of
MEDNICOFF I.B. groups and types of platelets in humans.
CHATTERJEE J.B. Anatomical Record. , 117, .579, 1953
61. VAN LOGHEM J. Serological and genetical studies on platelets
DRFMEIER H. -t. antigen Zwa.
VANDERHART H. Congress of International Society of Blood
Transfusion, VII th Session, ROME, Sept. 1958,
Proceedings. , No. 245. , p. 211.

IV ème Chapitre.

Anticorps anti-plaquettaires.

62. DAUSSET J. Influence de l'agitation sur l'agglutination
MALINVAUD G. thrombocytaire.
Le Sang, 25, 847-851, 1954.
63. DAUSSET J. Les thrombo-anticorps.
Extrait de 3ème Congrès International
d'allergologie, Paris, Oct. 1958.
Rapports de Congrès, p. 451-464?
64. Do Do
65. STEFANINI M.. Studies on platelets IX.
et coll. Blood, 8, 26-65, 1953, voir également no. 17.
66. FLUECKIGER P. Über den Thrombozyten Coombs Test.
HASSIG H. Schweiz Med. Wchschr. 83, 1035-1036, 1953.
KOLLER F.
67. DAUSSET J. voir no. 63.
68. GRANDJEAN L.C. A case of Purpura Hemorrhagica after
administration of Quinine with specific throm-
-bocytolysis demonstrated in vitro.
Acta. Med. Scand. 131, Suppl. . . , 165-170, 1948.
69. ACKROYD J.F. The pathogenesis of thrombocytic Purpura
due to hypersensitivity to Sedormid.
Clin. Sc. 7, 249-285, 1949.
70. SHULMAN N.R. Réactions immunologiques concernant les
plaquettes iii aspects quantitatifs de l'
l'inhibition de la rétraction du caillot et
d'autres réactions causées par les anticorps
du purpura à la quinidine.
J. Exp. Med. 107, 5, 697-710, 1958.

71. SHULMAN W.R. Reactions immunologiques concernant les plaquettes I Représentation: stériques et cinétiques schématiques de la formation d'un complexe formée d'anticorps humains, de quinidine comme haptène du complément par le complexe.
J.Exp.Med. 107,665-690,1958.
72. Do Immunoreaction involving platelets. Pathogenesis of Quinidine.
J.Exp.Med. 107,771;1958.
73. HILL TERREL Immunological reaction involving Platelets
J.Exp.Med.,107;691-695,1958.
74. SCHEN R.J.
RABINOVITZ M. Thrombocytopenic Purpura due to Quinidine
B.M.J. P;1502,20ème Dec.1956
75. BARKHAM P.
TOCANTINS L.M. Observations on the thrombocytopenia due to hypersensitivity to Quinine.
Blood,9,136-143,1954.
76. BIGELOW F.S.
DESFORGES J.F. Platelet agglutination by an abnormal plasma factor in thrombocytopenic purpura associated with Quinidine ingestion.
Am.J.of Med.Sc. ,224,274-280,1952.
77. HUNT J.C.
ANDERSON H.W.
HANLON D.G. Hemorrhagic diathesis related to Quinidine therapy.
Proc.Mayo Clin. 53,87-92,1958.
78. BOLTON F.G.
YOUNG R.V. Observations on cases of Thrombocytopenic Purpura due to Quinine, Sulphamezathiazol and Quinidine..
J.Cl;Path. 6,320-323,1953.
79. JONES R.A.
MACKERSIE K.M. Thrombocytopenic Purpura following Quinidine
B.M.J.,1,5032,1418-1419,1957.
80. LARSON R.K. THE mechanism of Quinidine Purpura.
Blood,8,16-25,1953.
81. NORROSS J.W. Quinidine as a cause of thrombocytopenic Purpura, report of a case.
How Engl J,Med.,242,2,53-54,1950.
82. PERRIN P.
DAUPHIN G.
DAUPHIN Mme. Les accidents thrombopéniques avec hémorragie dus à la quinidinothérapie.
Presse Méd. ,66,481-485,1958.
83. SPIELMANN W.
GATHOF A.
FRITZCHE W.
Etc. Über die Bedeutung der serologischen Reaktionen bei allergisch-medikamentös bedingten Thrombopenien, dargestellt an ein Fall von Chinidinpurpura.
Acta Haematol.17,287-304

84. PFEIFFER E.F.
85. STEWART-HESS C.H. Thrombocytopenic Purpura following Quinidine.
B.M.J., 1, 5029, 1244, 1957
86. WEISFUSE L.
SPEAR P.W.
SASS M. Quinidine induced thrombocytopenia Purpura
(Report of a fourteenth case and Review
of clinical and experimental studies).
Am.J; Med. 17, 414-422, 1954.
2) La quinine.
voir No; 68
87. GRANDJEAN L.C.
88. BOLTON F.G.
YOUNG R.V. voir No. 78
89. KIESMEYER-NIELSEN F. Thrombocytopenic Purpura following quinine
medication. An immunological study).
154, 289-298, 1956
90. STEINKAMP R.
MOORE C.V.
DOUBEK W.G. Thrombocytic Purpura caused by hypersensi-
tivity to Quinine.
3) Le sédormid. J. Lab. Clin. Med., 45, 18-30, 1955
91. ACKROYD J.F. The role of complement in Sedormid Purpura.
Clin. Sc. 10 185-207, 1951
92. Do The role of Sedormid in the immunological
reaction that results in platelet lysis in
sedormid purpura.
Cl; Sc., 15, 409-413, 1954;
93. Do Sedormid Purpura :An immunological study
of a form of drug hypersensitivity.
Progress in Allergy, 3, 531-572, 1952.
94. Do The mechanism of the reduction of clot
retraction by Sedormid in the blood of
patients who have recovered from Sedormid
Purpura.
Clin. Sc. 8, 235-267, 1949
95. Do The pathogenesis of thrombocytopenic Purpura
due to hypersensitivity to Sedormid.
Cl. Sc. 7, 249-285, 1949.
96. Do The cause of Thrombocytopenia in Sedormid
Purpura.
Clin. Sc., 8, 269-289, 1949.
97. GRIFONI V.
VOLTA A.
VANACORE C. Dinostrazione dell'attività tromboci-
tolitica del plasma in corso di porpora
da Sedormid.
98. KERR-GRANT D. Diagnosis of Sedormid Purpura,
B.M.J., 2, p; 128-133, 1953, 2
99. MIESCHER P.
MIESCHER A.
STRAESSLE R. Etude expérimentale du mecanisme des
cytopenies anaphylactiques.
Le Sang, 26 76-82, 1955.

4) La sulfonézathine;

100. BOLTON F.G.
YOUNG R.V.

voir No:78.

5) Divers médicaments.

101. BERTINO J.R.
RODMAN T.
MYERSON R.M.

Thrombocytopenia and renal lesions associated with acetazoleamide (Diamox) therapy. Arch.Intern.Med., 99, 1006-1008, 1957.

102. DAUSSET J.
MALINVAUD G.

Purpura thrombopéniques d'origine chimique. Opposition entre les mécanismes allergiques et toxiques. Rev. du Praticien, 4, 2931-2940, 1954

103. DAUSSET J.
MALINVAUD G.
LAYANI F.

Purpura thrombopénique aigu au Phenyl-dimethyl-isopropyl-pyrazolone. Mise en évidence d'une thrombo-agglutinine sérique active seulement en présence du médicament. Sen. Hosp., 30, 1952-1953

104. DAUSSET J.
BILSKI-PASQUIER B.
MALINVAUD G.
DAVY R.J.
TARA St.

Syndrômes hémorragiques par sensibilisation médicamenteuse. Etat actuel de la question à propos de l'observation de 1 cas de Purpura thrombopénique à L'allyl-isopropyl-acétylcarbamide.

Le Sang, 25, 9, 911-918, 1954.

105. RIGENBACH G.
HIRSCH O.

PURpura avec thrombo-anticorps après méthyl-phenyl-succinimide.

Le Sang, 26, 826, -827, 1955.

106. ROGNATO C.

L'Immunotrombocitopenia da idrazide dell'acido-isonicotonico.

Boll. Soc. Ital. Emat., 3, 231-235, 1955.

107. DAY H.J.
CONARD F.G.
MOORE J.E.

Thrombocytopenia induced by Novobiocin. Am. J. Med. Sci., 236, 4, 475-482, 1958

108. YOUNG F.

Thrombopenic purpura after buto-barbitone. B.M.J., Oct., 919-920, 1957.

109. RULIER J.

Contribution à la théorie des purpuras thrombopéniques médicamenteuse.

Thèse, Paris, 1955, 1 vol., 57 p. Vigne Editeur. Quantitative aspects of the immuno-reaction of drug Purpura.

110. SHULMAN N.R.

VII ème Congrès Int. Soc. d'Hémat., ROME, 1958

.....

V ème CHAPITRE.

Les Iso-Thrombo-agglutinines Immunes.

- | | | |
|-----------------|----------|--|
| III. HARRINGTON | et Coll. | voir No.56 |
| II2. S. i | et Coll. | voir No.57 |
| II3. WEINREICH | J. | Thro bocytopénie and platelet antibodies.
<u>Vox sanguinis</u> , 2, 294, 1957 |
| II4. SALMON | J. | |
| BOUNAMEAUX | Y. | Iso-immunisation après transfusions.
Anticorps anti-leucocytaires et leucopénies
<u>Rev. Fr. Cl. Biol.</u> , 8, 33-40, 1958 |
| II5. LUNDEVALL | J.L. | Serological studies of human Blood Platelets
Suppl. to vol 10, 1958 of the Scand. J. Cl. &
Lab. Investigation. , E. SEM A.S., Halden, 1958 |
| II6. DAUSSET | J. | |
| COLIN | M. | Technique de recherche des thrombo-agglut-
inines immunologiques. Influence du
chauffage préalable de la susension
plaquettaire.
<u>Rev. Fr. Et Clin. Biol.</u> 3, 60-61, 1958. |
| II7. BOUNAMEAUX | Y. | Dosage des facteurs de coagulation contenus
dans l'atmosphère plasmatique des plaqu-
ettes humaines.
<u>Rev. Fr. Et Clin Biol.</u> , 52-63, 1957 |
| II8. LUSCHER | E.F. | A dialysable facteur from plasma
responsibl for the "viscous metamorphosis
of the blood platelets. Its role in clot
retraction and hemostasis.
<u>Experientia</u> , 12, 368-370, 1956. |
| II9. DAUSSET | J. | |
| MALINVAUD | G. | voir No.59 |
| I20. DAUSSET | J. | |
| COLIN | M. | voir No.79. |
| I21. BOUNAMEAUX | Y. | voir No.80. |
| I22. COLOMBANI | J. | |
| DAUSSET | J. | Etude du facteur inhibiteur de la leuco-
agglutination.
... VII ème Congrès Soc. Int. de Tr. Sang.
Rome, 1958. |
| 123. DUBERT | J.M. | |
| SLIZEWICZ | P. | Nouvelle méthode de séparation des prot
ines sériques par le méthanol. Application
aux sérum de lapin et de cheval.
<u>Ann. Inst. Pasteur</u> , 84, 370-375, 1953. |
| REBEYROTTE | P. | |
| MACHEBOEUR | M. | |
| 124. SELIGMANN | M. | Mise en évidence d'un constituant ayant
l'antigénicité du fibrinogène dans des
extrait de plaquettes humaines lavées.
<u>C.R. Acad. Sci.</u> , 244, 2192-2194, 1957. |
| 125. do | | Do do |
| 126. CHALMERS | D. | |
| COOMBS | R.R.A. | The mixed antiglobuline reaction in the
detection of human iso-antibodies against
leucocytes , platelets and Hela cells.
<u>Brit. J. of Immun.</u> (à paraître). |
| DAUSSET | J. | |

127. DAUSSET J. Action des anticorps innus anti-plaquettaire
MAUPIN B. sur le thromb-dynamogramme.
SAMANMA M. Rev.Hemat. (à paraître)
PROSE R.J.
MARCHAL G.
128. MAUPIN et coll.
129. SELIGMANN M. Leuco-précipitines .II. Mise en évidence d'une
réaction de précipitation entre des extraits
leucocytaires et le sérum de malades atteints
de lupus érythémateux disséminé.
Vox Sanguinis, 2, 270-282, 1957.
130. DAUSSET J. Importance des anticorps anti-leucocytaires
COLOMBANI J. et anti-plaquettaire en pratique transfusa-
-nelle.
Transfusion, 3, 249 - 264, 1958.
131. MARCHAL G. Immunisation anti-leucocytaire et anti-pla-
DAUSSET J. quaire provoquée par l'injection répétée de
COLOMBANI J. même sang.
BILSKI-PASQUIER G. Le Sang, 29, 549-560, 1958.
JAULMES B.
BREC Y H.
EVELIN J.
- VII ème CHAPITRE DISCUSSION.
132. STEFANINI et coll. voir No.62
133. HARRINGTON et coll. voir No.56.
134. JAEGER-DRAAFSEL E. Detection of incomplete platelet antibodies
WIEGMAN D. by means of the indirect anti-humanglobulin
Van LOGHEM J.J. test.
Vox Sanguinis, 2, 78-82, 1956.
135. ANDRE R. Etude statistique des iso-immunisation anti-
DREYFUS B. erythrocytes, anti-leucocytes et antiplaquet-
SALMON Ch. taires étudiées sur 600 polytransfusés.
MALASSENET R. VII ème Congrès Int.Tr.Sang; Rome, 1958.
136. ANDRE R. Iso-immunisation antileucocytes après trans-
DREYFUS B. fusion anticorps antileucocytes et leucopé-
SALMON C. Rev;Fr;Et;Clin et. Biol. 3, 33-40, 1958.
137. BRITTINGHAM T.E. Febrile transfusion reactions caused by
CHAPLIN H.Jr; sensitivity to donor leukocytes and platelets
J.A.M.A., 165, 819-825, 1957.
- VII ème Chapitre.
Conclusion.
138. DAUSSET J. voir No.59.
MALINVAUD G.

DEUXIÈME THÈSE



Propositions données par la Faculté

"Structure et formation des plaquettes sanguines"

Vu et approuvé :

Paris, le 23 mai 1959

Le Doyen de la Faculté des Sciences

J. PERES

**Vu
et Permis d'imprimer**

Le Recteur de l'Académie de Paris

Jean SARRAILH

